
2018 年护师考试真题 1-100 题

相关专业知识

以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑

1. 过敏性紫癜主要累及的部位不包括

- A. 皮肤
- B. 消化道
- C. 关节
- D. 肾脏
- E. 心脏

2. 前尿道结石的治疗,最常用的方法是

- A. 多喝水、运动排石
- B. 体外震波碎石
- C. 尿道切开取石
- D. 中药排石
- E. 经尿道钩取或钳出结石

3. 上消化道出血的典型大便性状为

- A. 脓样
- B. 食糜样
- C. 米泔样
- D. 柏油样
- E. 白陶土样



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

4. 意识全部丧失,所有反射均消失的状态称为

- A. 嗜睡
- B. 昏睡
- C. 意识模糊

- D. 浅昏迷
- E. 深昏迷

5. 奇脉见于

- A. 心包积液
- B. 胸腔积液
- C. 胸腔积气
- D. 肺气肿
- E. 肺淤血

6. 获得性免疫缺陷综合征常用的治疗药物不包括

- A. 抗病毒药物
- B. 干扰素
- C. 免疫刺激剂
- D. 性激素

E. 抗生素

7. 脾破裂的治疗方式是

- A. 输血
- B. 输液
- C. 手术
- D. 止血药物
- E. 止痛剂

8. 关于老年高血压患者的用药,正确的是

- A. 大剂量开始
- B. 可联合用药
- C. 降压宜快
- D. 间断用药
- E. 可自行调整剂量

9. 大咯血窒息的首要抢救措施是

- A. 清除呼吸道内积血
- B. 立即切开支气管
- C. 加压湿化吸氧
- D. 用呼吸中枢兴奋剂
- E. 平卧头偏向一侧

10. 休克的治疗原则中首要的是

- A. 扩容
- B. 纠正酸中毒
- C. 维护心功能
- D. 控制感染



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

E. 维护肾功能

11. 患儿女,10 岁。由背痛引起脓血症,血细菌培养,取血应在

- A. 任何时间
- B. 退烧后
- C. 用过抗生素后
- D. 出现新转移脓肿时
- E. 寒战高热时

12. 关于 II 型呼吸衰竭的叙述,正确的是

- A. 二氧化碳潴留为主
- B. 低氧血症伴高碳酸血症
- C. 仅仅表现为氧耗量增加
- D. 表现为低氧血症
- E. 缺氧为主

13. 胸廓饱满,前后径与横径约相等,肋间隙加宽是属于

- A. 胸廓膨隆
- B. 扁平胸
- C. 桶状胸
- D. 鸡胸
- E. 漏斗胸

14. 治疗肾病综合征的首选药物是

- A. 免疫抑制剂
- B. 肾上腺糖皮质激素
- C. 抗生素
- D. 镇静剂
- E. 利尿剂

15. 可对肿瘤进行定性诊断的检查方法是

- A. 癌胚抗原
- B. CT
- C. MRI
- D. 病理检查
- E. 纤维内镜

16. 患者女,35 岁。因觉心悸到医院行心电图检查,心电图结果为窦性心律、心率 125 次/分,诊断为心律失常,此患者的心律失常是

- A. 房性期前收缩
- B. 窦性心动过速
- C. 窦性心动过缓
- D. 窦性心律不齐



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

E. 室性期前收缩

17. 肝脾破裂出血导致低血容量性休克,遵医嘱应快速输入

- A. 营养液
- B. 晶体胶体液
- C. 强心剂
- D. 利尿剂
- E. 镇静剂

18. 营养性巨幼红细胞性贫血特有的临床表现是

- A. 神经、精神症状
- B. 心率增快
- C. 疲乏无力
- D. 食欲不振
- E. 红细胞减少

19. 阿托品对有机磷农药中毒引起的症状没有疗效的是

- A. 平滑肌痉挛
- B. 多汗,流涎
- C. 肌纤维颤动
- D. 瞳孔缩小
- E. 肺部湿啰音

20. 患者男,30岁。左季肋部撞伤6小时,持续腹痛,B超见腹内有少量积液,腹穿抽到少量不凝固血液。可能的诊断是

- A. 肾脏损伤
- B. 脾破裂
- C. 空肠破裂
- D. 胰腺损伤
- E. 肝破裂

21. 对体弱的老年慢性阻塞性肺气肿患者的治疗中,不恰当的是

- A. 剧烈咳嗽者可用强镇咳剂缓解痛苦
- B. 应给予高蛋白、高维生素饮食
- C. 痰液粘稠者可雾化吸入
- D. 急性发作期要积极抗感染
- E. 病情缓解期可作全身锻炼和呼吸肌锻炼

22. 患者女,28岁。因一氧化碳中毒送入院,护士观察病情时,应特别警惕的并发症是

- A. 肺水肿
- B. 脑水肿
- C. 水电解质紊乱



金英杰医学®

JINYINGJIE.COM

D.迟发性脑病

E.昏迷

23.肝性脑病患者可以出现肝臭的时期是

A.昏迷期

B.昏睡期

C.前驱期

D.昏迷前期

E.轻微肝性脑病

24.子宫脱垂非手术治疗适用于

A.合并阴道膨出

B.I度

C.III度

D.合并直肠膨出

E.II度

25.对 ARDS 患者的气道管理,错误的做法是

A.加强气道湿化

B.严格无菌操作

C.吸痰前充分供氧

D.每小时吸痰

E.定时胸部理疗

26.足月儿,产钳助产娩出,出生时全身皮肤苍白,呼吸微弱,心率 30 次/分,肌张力松弛。生后首先应采取的措施是

A.弹足底或刺激皮肤以引起啼哭

B.面罩给氧

C.清除口鼻腔分泌物

D.注射 5%碳酸氢钠和呼吸兴奋剂

E.胸外心脏按压

27.输卵管妊娠辅助检查,最简单常用的是

A.CT

B.B超

C.X线

D.腹腔镜

E.宫腔镜

28.心肌梗死的典型心电图异常不包括

A.高耸状T波

B.ST段升高

C.T波倒置



金英杰医学®

JINYINGJIE.COM

D.ST 段水平压低

E.病理性 Q 波

29. 鼓励长期卧床的心衰患者在床上下肢活动的主要目的是

A. 预防压疮

B. 预防肌肉萎缩

C. 预防下肢静脉血栓形成

D. 保持机体活动力

E. 减少回心血量

30. 支气管肺炎的X 线表现特点是

A. 多发小脓肿

B. 小玻璃片状阴影

C. 网状结节样阴影

D. 粟粒状阴影

E. 斑片状阴影

31. 特发性血小板减少性紫癜的首选治疗是

A. 免疫抑制剂

B. 大剂量免疫球蛋白

C. 糖皮质激素

D. 输血小板

E. 脾切除

32. 治疗肝癌最有效的方法是

A. 放疗

B. 化疗

C. 手术治疗

D. 介入治疗

E. 生物治疗

33. 患者男,31 岁。头痛、乏力 5 个月,视物模糊 5 天。查体:血压 180/100mmHg,尿蛋白(++),尿红细胞 20/HP,眼底视网膜动脉痉挛,黄斑部有渗出与出血,视乳头无水肿。B 超示双肾体积缩小。最可能的诊断是

A. 原发性高血压肾损害

B. 肾动脉狭窄

C. 急进性肾衰

D. 肾性高血压

E. 恶性高血压肾损害

34. 患者男,48 岁。因胰腺癌接受胰十二指肠切除术,术后对患者进行饮食指导时,下列叙述正确的是

A. 严格限制盐的摄入



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

-
- B. 应摄入低脂饮食
 - C. 需控制蛋白质摄入
 - D. 必须低糖饮食
 - E. 无饮食限制

35. 关于支气管扩张症,错误的叙述是


- A. 大多数支气管扩张症患者咳黄绿色痰,痰液静置后可分层
- B. 干性支气管扩张症主要为反复咯血,可无慢性咳嗽、咳痰
- C. 支气管扩张症并非一种独立的疾病,其病因可为一种或多种病因同时存在
- D. 纤维支气管镜可以有助于明确诊断支气管扩张症
- E. 支气管扩张症好发部位以左肺多于右肺

36. 患者男,38 岁。诊断为早期胃癌,首选的治疗方法是里

- A. 免疫治疗
- B. 放疗
- C. 中医中药
- D. 化疗
- E. 手术

37. 体温每降低 1℃可使氧耗率下降

- A. 5%~6%
- B. 3%~4%
- C. 4%~5%
- D. 7%~8%
- E. 6%~7%



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

38. 对暂时难以明确诊断的急腹症患者应采取的处理措施是

- A. 应用镇静镇痛药物
- B. 积极剖腹探查
- C. 应用泻药清理肠道
- D. 给予温盐水灌肠
- E. 抗休克、抗感染治疗

39. 关于结核病药物的治疗原则,不正确的叙述是

- A. 规律用药
- B. 早期治疗
- C. 酌情停药
- D. 联合用药
- E. 剂量适宜

40. 患者男,68 岁。患心脏瓣膜病、房颤 20 年,服用地高辛 5 年。近 3 天突然出现恶心、呕吐,同时伴有心悸、头痛、头晕、视物模糊。心电图示室性早搏二联律。患者可能出现了

- A. 洋地黄类药物中毒

-
- B. 高血压
 - C. 消化性溃疡
 - D. 心力衰竭
 - E. 低血压

41. 青春期功血的治疗原则是

- A. 缩短月经周期
- B. 调整垂体与性腺功能
- C. 减少月经量、调整周期
- D. 止血、调整周期、促进排卵
- E. 减少月经量

42. 患儿男,8岁。食欲不振,8小时后右耳周围肿痛,同学中有类似患者。查体肿大以右耳垂为中心,皮肤发热,触之坚韧有弹性,疼痛,张口及咀嚼时加重。最可能的诊断是

- A. 急性淋巴结炎
- B. 急性上呼吸道感染
- C. 麻疹
- D. 化脓性中耳炎
- E. 流行性腮腺炎

43. 肾病综合征的临床表现不包括

- A. 高血压
- B. 低蛋白血症
- C. 高度水肿
- D. 高蛋白尿
- E. 血脂低



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

44. 患者男,45岁。血尿半个月,每次均为初血尿。则出血部位在

- A. 后尿道
- B. 肾脏
- C. 膀胱颈部
- D. 前尿道
- E. 膀胱三角

45. 患者男,20岁。闭合性腹部损伤 2 小时,腹痛,BP80/60mmHg,P125 次/分,腹腔抽出不凝固血液,目前主要的处理原则是

- A. 输血输液抗休克
- B. 应用有效的抗生素
- C. 密切观察病情变化
- D. 抗休克同时剖腹探查
- E. 禁食,持续胃肠减压

46. 胆囊结石的治疗原则是

-
- A. 体外震波碎石
 - B. 溶石疗法
 - C. 胆囊切除
 - D. 胆囊切开放石
 - E. 胆囊造口

47. 颅内压增高明显的患者应避免进行的检查是

- A. 数字减影血管造影(DSA)
- B. 头颅X线
- C. 电子计算机断层扫描(CT)
- D. 磁共振(MR)
- E. 腰椎穿刺

48. 患者男,67岁。尿频及排尿困难 5 年余,无心肺疾病,BP160/100mmHg,诊断为良性前列腺增生,残余尿量 200ml,合适的治疗方法是

- A. 受体阻滞剂
- B. 经尿道前列腺电切术
- C. 开放式前列腺切除术
- D. 经尿道高温治疗
- E. 体外高强度聚焦超声

49. 肾移植供、受者淋巴细胞毒性试验要求

- A. <40%
- B. <30%
- C. <20%
- D. <50%
- E. <10%或为阴性

50. 阴道脱落细胞可来源的部位不包括

- A. 卵巢
- B. 盆腔
- C. 腹腔
- D. 输卵管
- E. 子宫腔

51. 诊断慢性胃炎最可靠的方法是

- A. 胃液酸度分析
- B. 胃肠钡餐造影
- C. 病史及临床表现
- D. 血清抗体测定
- E. 纤维胃镜检查

52. 尿液呈酱油色见于



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

-
- A. 高热尿浓缩
 - B. 输异型血溶血
 - C. 输液过多
 - D. 尿中胆红素增加
 - E. 尿道感染出血

53. 心室颤动首选的治疗措施是

- A. 非同步电复律
- B. 心内注射肾上腺素
- C. 胺碘酮静注
- D. 同步电复律
- E. 静脉注射苯妥英钠

54. 患者男,34岁。腰麻下行阑尾切除术术后发生尿潴留,其主要原因是

- A. 手术部位疼痛
- B. 不习惯病室排尿
- C. 不习惯卧床排尿
- D. 精神紧张
- E. 麻醉反应

55. 患者男,20岁。车祸后呼吸窘迫,来医院急诊。查体:右胸部饱满,呼吸音消失,叩诊呈鼓音,右胸部有骨擦音、皮下气肿。首要的急救措施是

- A. 剖胸探查
- B. 闭式胸腔引流
- C. 镇静、吸氧抗感染
- D. 输血、输液抗休克
- E. 胸腔穿刺排气减压

56. 诊断结肠癌的相关指标是

- A. 碱性磷酸酶
- B. 癌胚抗原
- 乳酸脱氢酶
- D. 酸性磷酸酶
- E. 甲胎蛋白

57. 新生儿硬肿症的首要护理措施是

- A. 复温
- B. 局部处理
- C. 保持气道通畅
- D. 供给能量合剂
- E. 预防感染

58. 决定心脏病患者是否妊娠,最重要的依据是



-
- A. 家族史
 - B. 心脏病的种类,
 - C. 治疗情况
 - D. 生育史
 - E. 心功能分级

59. 患者男,65 岁。因急性肠梗阻,出现呼吸深、快,呼气有酮味,心率 100 次/分,血压下降,面部潮红,口唇樱红,CO₂CP 低于正常。为纠正其酸碱平衡失调,首选的药物是

- A. 生理盐水
- B. 5%碳酸氢钠
- C. 11.2%乳酸钠
- D. 0%葡萄糖液
- E. 0%氯化钾

60. 关于产褥感染的处理原则,错误的是

- A. 半卧位以利引流
- B. 改善全身一般情况
- C. 禁用肾上腺糖皮质激素,以防炎症扩散
- D. 选用有效的抗生素
- E. 胎盘残留者,应控制感染后清宫

61. TAT 治疗破伤风的机制是

- A. 抗化脓菌
- B. 解痉
- C. 抗破伤风杆菌
- D. 中和血中游离毒素
- E. 镇静

62. 烧伤现场急救的首要任务是

- A. 防治感染
- B. 镇静止痛
- C. 抢救生命
- D. 保护创面
- E. 尽快转运

63. 慢性盆腔炎术后第 1 天,患者宜取的体位是

- A. 半卧位
- B. 俯卧位
- C. 平卧位
- D. 侧卧位
- E. 头低脚高位

64. 患者女,21 岁。发热、多处关节炎、面部有蝶形红斑,诊断为系统性红斑狼疮。特异性高的



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

检查结果是

- A. 红细胞花环形成
- B. 抗 Sm 抗体(+)
- C. 抗核抗体(+)
- D. 血沉快
- E. 类风湿因子(+)

65. 患者女,G;Po,孕 34+3 周。无任何诱因突感有较多液体自阴道流出,产科检查:无宫缩,胎先露高浮,考虑胎膜早破。护士指导患者应绝对卧床,采取的最佳卧位是

- A. 平卧位
- B. 右侧卧位
- C. 俯卧位
- D. 左侧卧位
- E. 抬高臀部

66. 患儿,3 个月。腹泻 2 日,呈黄绿色稀便,有奶瓣和泡沫,为纠正轻度脱水,应选择

- A. 少量多次饮温开水
- B. 静脉补充 10%葡萄糖溶液
- C. 少量多次喂服ORS 液
- D. 静脉补充林格液
- E. 少量多次给予糖水

67. 产后督促产妇排尿的时间应为

- A. 产后 4~6 小时
- B. 产后 7~8 小时
- C. 产后 1~2 小时
- D. 产后 9~12 小时
- E. 产后 2~3 小时

68. 急性化脓性乳腺炎好发于

- A. 产后 3~4 周
- B. 产后 5~6 周
- C. 产后 4~5 周
- D. 产后 6~7 周
- E. 产后 1~2 周

69. 引起血栓闭塞性脉管炎的常见原因为

- A. 大量饮酒
- B. 缺乏锻炼
- C. 低盐饮食
- D. 长期吸烟
- E. 高糖饮食

70. 应用 B2 受体激动剂控制哮喘发作时首选的给药方法是



-
- A. 肌注法
 - B. 口服法
 - C. 舌下含化法
 - D. 静滴法
 - E. 吸入法

71. 冠心病外科治疗必须进行的辅助检查是

- A. 心血管造影
- B. 心脏 CT
- C. 心导管检查
- D. 心脏彩色 B 超
- E. 选择性冠状动脉造影

72. 治疗食管癌的首选方法是

- A. 中药治疗
- B. 化疗
- C. 内镜治疗
- D. 放疗
- E. 手术治疗

73. 儿童肺结核的主要类型是

- A. 支气管内膜结核
- B. 原发型肺结核
- C. 干酪性肺炎
- D. 继发型肺结核
- E. 急性粟粒型肺结核



74. Graves 病中最重要而特异的体征是

- A. 粘液性水肿
- B. 怕热多汗
- C. 突眼
- D. 甲状腺肿大
- E. 甲状腺危象

75. 陈旧性肛裂的治疗原则为

- A. 在溃疡基底封闭注射
- B. 手术切除
- C. 局部理疗
- D. 热水坐浴
- E. 早期使用抗菌药物

76. 早期支气管肺癌的首选治疗方法是

- A. 化疗及中医疗法

-
- B. 放疗及化疗联合应用
 - C. 健康状况良好者行放疗
 - D. 手术切除癌肿病灶
 - E. 各种免疫疗法

77. 临产诊断不包括

- A. 胎先露部下降
- B. 见红
- C. 进行性子宫颈管消失
- D. 宫颈口扩张
- E. 规律性子宫收缩

78. 患者男,60 岁。时有膀胱刺激症状,伴排尿困难及尿流中断,改变体位后可继续排尿,最可能的诊断是

- A. 急性膀胱炎
- B. 膀胱肿瘤
- C. 膀胱结石
- D. 泌尿系结核
- E. 急性肾盂肾炎

79. 急性感染性多发性神经根神经炎患者脑脊液的典型改变是

- A. 氯化物减少
- B. 蛋白细胞分离
- C. 均匀血性
- D. 压力增高
- E. 糖明显增多



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

80. ORS(口服补液盐)液的成分中电解质含量最多的是

- A. 葡萄糖
- B. 碳酸氢钠
- C. 氯化钾
- D. 氯化钠
- E. 氯化钙

81. 对原发性肝癌最有意义的检测是

- A. 癌胚抗原
- B. 甲胎蛋白
- C. 血浆蛋白
- D. 粪便隐血
- E. 肝功能

82. 类风湿关节炎中,因为侧韧带从近端指间关节两侧滑脱及挛缩而致的畸形是

- A. 天鹅颈

-
- B. 纽扣花
 - C. 技工手
 - D. 望远镜手
 - E. 扳机手

83. 患者男,50 岁。餐后上腹部烧灼痛 2 个月,黑便 2 日入院。对其诊断最有价值的辅助检查是


- A. 胃镜检查
- B. 血常规检查
- C. 选择性动脉造影
- D. X 线检查
- E. 胃液分析检查

84. 急性心肌横死最早发生变化的酶是

- A. 肌酸磷酸酶
- B. 淀粉酶
- C. 转氨酶
- D. 谷丙转氨酶
- E. 碱性磷酸酶

85. 治疗肾病综合征的首选药物是

- A. 免疫抑制剂
- B. 利尿剂
- C. 肾上腺皮质激素
- D. 镇静剂
- E. 抗生素



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

86. 患者男,34 岁,腰麻下行阑尾切除术后发生尿潴留,其主要原因是

- A. 麻醉反应
- B. 不习惯病室排尿
- C. 不习惯卧床排尿
- D. 手术部位疼痛
- E. 精神紧张

87. 肠性氮质血症,血尿素氮值达到高峰的时间是

- A. 12-24 小时
- B. 16-32 小时
- C. 8-16 小时
- D. 20-40 小时
- E. 14-48 小时

(88-89 题共用备选答案)

- A. 直颈片细胞学检查

-
- B. 碘试验
 - C. 氮激元肿固有凭光诊断法
 - D. 阴道镜检查
 - E. 宫颈和宫颈管活组织病理检查

- 88. 确定宫颈癌前期病变和宫颈癌最可靠的方法是
- 89. 早期发现宫颈癌的重要方法是

(90-92 题共用备选答案)

- A. 超过正常体重 20%
- B. 超过正常体重 20%~29%
- C. 超过正常体重 30%-49%
- D. 超过正常体重 50
- E. 超过正常体重 60%

- 90. 属于儿童轻度肥胖的为
- 91 属于儿童中度肥胖的为
- 92 属于儿童重度肥胖的为

(93~94 题共用备选答案)

- A. 十二指肠造瘘给予
- B. 空肠造瘘管给予
- C. 胃造瘘管给予
- D. 鼻肠管给予
- E. 鼻胃管给予



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM

- 93. 对于短期、胃肠功能良好的昏迷患者，肠内营养可经
- 93. 治疗白血病的药物会产生心脏毒性的是
- 94. 治疗白血病的药物会产生出血性膀胱炎的是

(95~96 题共用备选答案)

- A. 子宫腔内绒毛水泡状水肿和滋养细胞增生
- B. 子宫肌内水泡状组织,有绒毛结构,滋养细胞增生、分化不良
- C. 子宫肌内滋养细胞极度不规则增生,周围大片出血、坏死,绒毛结构消失
- D. 子宫腔内可见毛发、油脂,有时可见牙齿或骨质
- E. 子宫腔内可见菜花样肿块

- 95. 葡萄胎的病理特点是
- 96. 绒毛膜癌的病理特点是

(97~98 题共用备选答案)

- A. 十二指肠造瘘给予
- B. 空肠造瘘管给予

-
- C. 胃造瘘管给予
 - D. 鼻肠管给予
 - E. 鼻胃管给予

- 97. 对于短期、胃肠功能良好的昏迷患者,肠内营养可经
- 98. 对于术后胃瘫的患者,肠内营养可经

(99~100 题共用备选答案)

- A. 宫颈刮片细胞学检查
- B. 碘试验
- C. 氮激光肿瘤固有荧光诊断法
- D. 阴道镜检查
- E. 宫颈和宫颈管活组织病理检查

- 99. 确定宫颈癌前期病变和宫颈癌最可靠的方法是
- 100. 早期发现宫颈癌的重要方法是



金英杰医学®
JINYINGJIE.COM