

西药二 100 题

1. 地西洋与巴比妥类比较，不具有的作用是
A. 麻醉 B. 抗焦虑
C. 抗惊 D. 抗癫痫
E. 镇静、催眠
2. 患者，女，45 岁，3 个月前曾查出肿瘤并采用放射治疗，现因高尿酸血症住院治疗，下列药物禁止用于该患者的是
A. 秋水仙碱 B. 丙磺舒
C. 别嘌醇 D. 塞来昔布
E. 非布司他
3. 可阻断肺-胸膜的牵张感受器产生的肺迷走神经反射，适用于各种原因引起的刺激性干咳的药物是
A. 苯丙哌林 B. 喷托维林
C. 羧甲司坦 D. 可待因
E. 右美沙芬
4. 应用双八面体蒙脱石治疗腹泻的适宜服药时间是
A. 餐前 B. 餐中
C. 餐后半小时 D. 两餐之间
E. 清晨 7 点
5. 能够促进细胞的生长与分化，使肌肉扩增的半合成激素类药物是
A. 西格列汀 B. 降钙素
C. 氟他胺 D. 阿法骨化醇
E. 司坦唑醇
6. 可用于治疗雌激素缺乏引起的绝经期综合征，治疗前必须评估患者血栓事件发生风险的药物是
A. 胰岛素 B. 苯丙酸诺龙
C. 尼尔雌醇 D. 左甲状腺激素
E. 丙酸睾酮
7. 能够减少 ACEI 引起的咳嗽发生的是
A. 普茶洛尔 B. 阿司匹林

- C. 氧氟沙星 D. 谷胱甘肽
E. 乙酰半胱氨酸

8. 下列关于丙硫氧嘧啶作用机制说法正确的是

- A. 抑制甲状腺激素的生物合成 B. 抑制甲状腺激素的释放
C. 抑制甲状腺对碘的摄取 D. 抑制甲状腺球蛋白水解
E. 抑制促甲状腺激素对甲状腺的作用

9. 可与奎尼丁发生与P-糖蛋白有关的相互作用的药物是

- A. 华法林 B. 达比加群酯
C. 低分子肝素 D. 肝素钠
E. 维生素K

10. 葡萄糖不用于以下哪种情况的治疗

- A. 低血糖症 B. 青光眼
C. 饥饿性酮症 D. 低磷血症
E. 高钾血症

11. 下列药物中主要由胆汁排出的是

- A. 头孢哌酮 B. 头孢拉定
C. 头孢氨苄 D. 青霉素
E. 磷霉素

12. 下列药物中不引起双硫仑样反应的是

- A. 头孢曲松 B. 头孢哌酮
C. 头孢西丁 D. 头孢孟多
E. 头孢拉定

13. 磺胺类抗菌药物对以下哪种病原微生物无效

- A. 衣原体 B. 原虫
C. 革兰阳性球菌 D. 铜绿假单胞菌
E. 立克次体

14. I类清洁切口术后预防性应用抗菌药物的时间一般控制在

- A. 12h 内 B. 24h 内
C. 36h 内 D. 48h 内
E. 72h 内

15. 抗雄激素类抗肿瘤药引起的迟发性毒性是

- A. 阴道出血
- B. 月经不调
- C. 男性化
- D. 男子乳房发育
- E. 恶心、呕吐

16. 以下不属于抗疱疹病毒药的是

- A. 阿糖胞苷
- B. 阿昔洛韦
- C. 膦甲酸钠
- D. 西多福韦
- E. 伐昔洛韦

17. 治疗蛔虫病、蛲虫病、鞭虫病和钩虫病首选

- A. 噻嘧啶
- B. 甲苯咪唑
- C. 哌嗪
- D. 甲硝唑
- E. 磺胺嘧啶

18. 下列非甾体抗炎药中有类磺胺反应的是

- A. 对乙酰氨基酚
- B. 吲哚美辛
- C. 布洛芬
- D. 双氯芬酸
- E. 塞来昔布

19. 治疗量与中毒量很接近, 宜于晨服的药物是

- A. 多索茶碱
- B. 沙丁胺醇
- C. 二羟丙茶碱
- D. 氨茶碱
- E. 孟鲁司特

20. 可干扰叶酸的吸收, 使阿卡波糖的药效降低的助消化药物是

- A. 乳酶生
- B. 乳酸菌素
- C. 胰酶
- D. 替普瑞酮
- E. 硫酸铝

21. β_2 受体激动剂治疗哮喘的主要作用机制是

- A. 减轻炎症反应
- B. 减慢心脏传导
- C. 松弛支气管平滑肌
- D. 抑制咳嗽反射
- E. 抑制细菌繁殖

22. 伴有活动性胃溃疡的高血压患者不宜用

- A. 硝苯地平
- B. 尼群地平
- C. 维拉帕米
- D. 非洛地平
- E. 利血平

23. 应用硝普钠时的注意事项及用药监护不包括

- A. 监测血压
- B. 血硫氰酸盐水平
- C. 避光使用
- D. 缓慢静注
- E. 局部刺激性，防止外渗

24. 氨甲环酸的作用机制是

- A. 刺激血小板生成
- B. 激活凝血因子
- C. 对抗纤维蛋白溶解
- D. 促使毛细血管收缩
- E. 促进肝脏合成凝血酶原

25. 在常用剂量下，非那雄胺可使血清前列腺特异抗原 (PSA) 水平下降的幅度为

- A. 10%
- B. 25%
- C. 50%
- D. 60%
- E. 75%

26. 碳酸钙用于肾衰竭患者降低血磷时，适宜的服药时间是

- A. 餐前
- B. 清晨或睡前
- C. 餐后
- D. 餐中
- E. 餐后即刻

27. 功能性子宫出血可选用的药物是

- A. 米非司酮
- B. 司坦唑醇
- C. 他莫昔芬
- D. 雌二醇
- E. 西地那非

28. 会加重奥沙利铂所致的严重神经系统毒性 (感觉障碍、痉挛) 的行为是

- A. 饮用热饮
- B. 日光浴
- C. 接触塑料制品
- D. 冷水浴
- E. 温泉浴

29. 下列药物可用于治疗小细胞肺癌首选的是

- A. 依托泊苷
- B. 替尼泊苷
- C. 奥沙利铂
- D. 长春新碱

E. 博来霉素

30. 下列哪类药物属于繁殖期杀菌药

- A. 磺胺类
- B. 青霉素类
- C. 氯霉素类
- D. 多黏菌素 B
- E. 四环素类

31. 某患者, 63 岁, 诊断为“慢性支气管炎急性发作”, 痰培养为“铜绿假单胞菌”, 下列哪种药物对铜绿假单胞菌无效

- A. 哌拉西林
- B. 头孢克洛
- C. 头孢哌酮
- D. 头孢他啶
- E. 头孢曲松

32. 应用强心苷期间或停用后 7 日内不宜使用的药物是

- A. 氯化钠
- B. 氯化钾
- C. 氯化钙
- D. 枸橼酸钾
- E. 门冬氨酸钾镁

33. 在葡萄糖溶液中稳定, 用 5%葡萄糖做溶媒的化疗药是

- A. 帕拉西林
- B. 顺铂
- C. 依托泊苷
- D. 奥沙利铂
- E. 曲妥珠单抗

34. 治疗重症或急性哮喘发作会出现低血钾, 与糖皮质激素、利尿剂合用加重低血钾风险的药物是

- A. 沙丁胺醇
- B. 茶碱
- C. 异丙托溴铵
- D. 孟鲁司特
- E. 噻托溴铵

35. 治疗弥散性血管内凝血宜选用

- A. 肝素
- B. 达比加群酯
- C. 叶酸
- D. 阿司匹林
- E. 华法林

36. 服用西地那非可导致

- A. 高血压
- B. 心律失常
- C. 视物模糊、复视
- D. 肾功能异常

E. 中枢神经系统毒性

37. 治疗高血压危象的药物是

- A. 普萘洛尔 B. 硝普钠
- C. 依那普利 D. 可乐定
- E. 氢氯噻嗪

38. 治疗葡萄球菌感染导致的骨髓炎首选

- A. 青霉素 B. 头孢克洛
- C. 阿米卡星 D. 米诺环素
- E. 克林霉素

39. 患者, 女性, 62 岁, 有高血压病史 14 年, 伴变异性心绞痛, 最近频繁发生阵发性室上性心动过速, 宜选用

- A. 维拉帕米 B. 尼莫地平
- C. 硝苯地平 D. 普萘洛尔
- E. 美西律

40. 异烟肼抗结核杆菌的机制是

- A. 抑制细菌细胞壁的合成 B. 抑制 DNA 螺旋酶
- C. 抑制细胞核酸代谢 D. 抑制细菌分支菌酸合成
- E. 影响细菌胞质膜的通透性

41. 长期服用可引起阳痿的抗消化性溃疡药物是

- A. 氢氧化铝 B. 西咪替丁
- C. 哌仑西平 D. 米索前列醇
- E. 硫糖铝

42. 胰酶与下述哪种药物同服时疗效增强

- A. 胃酶合剂 B. 法莫替丁
- C. 叶酸 D. 阿卡波糖
- E. 稀盐酸

43. 下述关于双八面体蒙脱石的描述, 错误的是

- A. 具有吸附、收敛的作用
- B. 不被胃肠道吸收, 不进入血液循环
- C. 属于抗动力药

- D. 不良反应少,可用于治疗儿童的急、慢性腹泻
- E. 可能影响其他药物的吸收,必须合用时在服用本品之前 1h 服用

44. 可用于 1 岁以下婴幼儿急、慢性腹泻,食管、胃及十二指肠疾病引起的相关疼痛症状的辅助治疗的药物是

- A. 地芬诺酯 B. 洛哌丁胺
- C. 番泻叶 D. 双八面体蒙脱石
- E. 酚酞

45. 治疗男性阴茎勃起障碍宜选用的药物是

- A. 雌二醇 B. 苯丙酸诺龙
- C. 他莫昔芬 D. 非那雄胺
- E. 西地那非

46. 可局部用于治疗皮肤、口腔及阴道念珠菌感染的药物是

- A. 两性霉素 B B. 多黏菌素 B
- C. 四环素 D. 灰黄霉素
- E. 制霉菌素

47. 用青霉素治疗梅毒、钩端螺旋体病时能出现寒战、咽痛、心率加快等症状,其原因可能是大量病原体被杀灭后出现的全身性反应,这种反应称为

- A. 瑞-夷综合征 B. 青霉素脑病
- C. 金鸡纳反应 D. 赫氏反应
- E. 史蒂文斯—约翰综合征

48. 与丙戊酸钠合用可引发癫痫的药物是

- A. 克拉霉素 B. 替考拉宁
- C. 美罗培南 D. 大观霉素
- E. 氯霉素

49. 用药过程中需要监护迟发性腹泻的是

- A. 伊立替康 B. 多柔比星
- C. 长春碱类 D. 紫杉醇
- E. 他莫昔芬

50. 可用于治疗 CD20 阳性的非霍奇金淋巴瘤的单克隆抗体是

- A. 曲妥珠单抗 B. 利妥昔单抗

- C. 贝伐单抗
- D. 西妥昔单抗
- E. 英夫利昔单抗

[51-53]

- A. 丙戊酸钠
- B. 佐匹克隆
- C. 多奈哌齐
- D. 布桂嗪
- E. 氟西汀

51. 尚可用于双相情感障碍的抗癫痫药是

52. 老年痴呆症选用

53. 焦虑抑郁选用

[54-56]

- A. 哌替啶
- B. 多奈哌齐
- C. 苯妥英钠
- D. 地西洋
- E. 帕罗西汀

54. 可用于治疗阿尔茨海默病的药物是

55. 可用于治疗心源性哮喘的药物是

56. 可用于治疗惊恐障碍和社交恐惧症的药物是

[57-59]

- A. 噻托溴铵
- B. 孟鲁司特
- C. 氨茶碱
- D. 沙丁胺醇
- E. 倍氯米松

57. 常见震颤（尤其手震颤），长期高剂量使用可引起严重的低钾血症的平喘药是

58. 常见嗜酸性粒细胞增多，可引起血管炎性皮疹的平喘药是

59. 可导致眼压升高、视物模糊、青光眼的平喘药是

[60-63]

- A. 干扰素
- B. 胸腺肽
- C. 阿糖腺苷
- D. 金刚烷胺
- E. 膦甲酸钠

60. 抑制茶碱代谢, 使茶碱血药浓度升高

61. 不能与含钙制剂配伍

62. 与抗精神病药、多潘立酮、甲基多巴、甲氧氯普胺可增加锥体外系不良反应的风险

63. 不能与其他肾毒性药物同时使用

[64-66]

- A. 非诺贝特
- B. 阿昔莫司
- C. 辛伐他汀
- D. 氢氯噻嗪
- E. 氨氯地平

64. 主要降低总胆固醇（TC）和低密度脂蛋白胆固醇（LDL-ch）的调节血脂药是

65. 以降低三酰甘油（TG）为主，易引起胆石症且 AST 及 ALT 升高的调节血脂药是

66. 可升高 HDL-ch 降低 TG 及 LDL-ch, 可见皮肤潮红及瘙痒的调节血脂药是

[67-69]

- A. 纤溶亢进所致的出血
- B. 双香豆素类过量引起的出血
- C. 肾性、非肾性贫血
- D. 弥散性血管内凝血早期
- E. 血栓栓塞性疾病

67. 氨基己酸的适应证为

68. 维生素 K 的适应证为

69. 重组人促红素的适应证为

[70-74]

- A. 更昔洛韦
- B. 四环素可的松
- C. 利巴韦林
- D. 氯霉素
- E. 碘苷

70. 长期大量使用可导致肝功能异常的药物是

71. 长期使用可出现角膜浑浊的药物是

72. 精神病患者及神经中毒症状者应慎用的药物是

73. 长期频繁使用可致眼部真菌感染的药物是

74. 滴眼后可出现口腔苦味的药物是

[75-77]

- A. 降钙素
- B. 碳酸氢钠
- C. 氟马西尼
- D. 维生素 E
- E. 亚叶酸钙

75. 中老年骨质疏松患者在补钙同时宜同步补充

76. 在应用磺胺类药物时，疗程长、剂量大时除足量饮水外宜同服

77. 大剂量应用甲氨蝶呤后，可选用的解救药物是

[78-79]

- A. 氢化可的松
- B. 泼尼松
- C. 甲泼尼龙
- D. 倍他米松
- E. 苯丙酸诺龙

78. 属于长效糖皮质激素的是

79. 属于短效糖皮质激素的是

[80-82]

- A. 5%过氧苯甲酰
- B. 酮康唑
- C. 林旦
- D. 特比萘芬
- E. 两性霉素 B

80. 皮脂腺分泌过多所致的寻常痤疮宜选用

81. 深部和皮下真菌感染宜选用

82. 疥疮和阴虱病宜选用

[83-84]

- A. 氟尿嘧啶
- B. 顺铂
- C. 博来霉素
- D. 伊立替康
- E. 柔红霉素

83. 具有抗胆碱酯酶活性，可延长琥珀胆碱的神经肌肉阻滞作用的是

84. 合用甲氨蝶呤有协同作用，一般需在甲氨蝶呤治疗 4~6h 后给予以助于药物活化的是

[85-87]

- A. 卡泊芬净
- B. 咪康唑
- C. 制霉菌素
- D. 灰黄霉素
- E. 特比萘芬

85. 属于咪唑类抗真菌药的是

86. 属于棘白菌素类抗真菌药的是

87. 属于丙烯胺类抗真菌药的是

[88-89]

- A. 抑制蛋白质的合成
- B. 抑制细菌的拓扑异构酶
- C. 抑制细菌细胞壁的合成
- D. 影响细胞膜的通透性
- E. 影响叶酸代谢

88. 大环内酯类抗菌药的抗菌作用机制是

89. 磺胺类抗菌药的抗菌作用机制是

[90-92]

- A. 磺胺嘧啶
 - B. 磺胺米隆
 - C. 柳氮磺吡啶
 - D. 磺胺甲唑
 - E. 磺胺醋酰钠
90. 口服难吸收, 用于治疗溃疡性结肠炎的药物
91. 可用于烧伤及伤后感染的是
92. 用于眼部感染如沙眼、结膜炎和角膜炎

[93-95]

- A. 甲氧氯普胺
 - B. 甲地孕酮
 - C. 格雷司琼
 - D. 阿瑞吡坦
 - E. 奥美拉唑
93. 属于多巴胺受体阻断剂的止吐药物是
94. 属于 5-HT₃受体阻断剂的止吐药物是
95. 属于 NK-1 受体阻断剂的止吐药物是

[96-97]

- A. 右美沙芬
 - B. 特布他林
 - C. 异丙托溴铵
 - D. 孟鲁司特
 - E. 氨茶碱
96. 起效缓慢, 连续应用 4 周才见效, 对 12 岁以下儿童、妊娠及哺乳妇女宜慎重应用的平喘药物是
97. 有效时间可长达 8~12h, 用药期间不宜饮酒的镇咳药物是

[98-100]

- A. 维生素 K₁
 - B. 鱼精蛋白
 - C. 葡萄糖酸钙
 - D. 氨基己酸
 - E. 叶酸
98. 肝素过量可选用的拮抗药是
99. 华法林应用过量可选用的拮抗药是
100. 链激酶应用过量可选用的拮抗药是