
心脏瓣膜考的视频题，室颤是图片题
压疮分期的图片题
老奶奶退休，属于冷漠型

子宫重度脱垂检查选啥？阴道检查
肛门检查
腹部检查
双合诊
三合诊

患者女性，绒毛膜癌，出现剧烈头痛、喷射性呕吐、偏瘫。家属询问护士可能的原因，舒适正确的回答是

- A.肺转移
- B.脑转移
- C.阴道转移
- D.肝转移
- E.肾转移

成人胸外按压无论是一人还是两人都是 30:2

2.患者，男，36岁，因车祸致下肢瘫痪来诊，初步诊断为腰椎骨折。运送患者时最佳的方式是

- A.轮椅运送法
- B.平车挪动法
- C.平车单人搬运法
- D.平车两人搬运法
- E.平车四人搬运法

答案：E

解析：四人搬运法适用于颈、腰部骨折，体重较重或病情较重者。

3.患者，女，22岁，未婚，因宫外孕入院治疗。护士在与患者沟通时，其家属推门进入病房，患者突然沉默不语，拒绝回答。此时病房，患者突然沉默不语，拒绝回答。此时影响沟通效果的因素

- A.情绪因素
- B.认知因素
- C.文化因素
- D.身体因素
- E.隐秘因素

答案：E

解析：患者为未婚宫外孕女性，其个人隐私可能影响到沟通效果。因此，护士在与其交谈时，应考虑沟通环境的隐秘性是否良好，可选择无人打扰的房间或请其他人离开，以解决患者顾虑，保证沟通的有效进行。

4.机体处于应激如创伤、手术、感染等情况下，能量代谢的变化中，错误的是

- A.机体出现高代谢
- B.脂肪动员加速

- C.蛋白质分解加速
- D.处理葡萄糖能力增强
- E.分解代谢加强

答案：D

解析：创伤等外周刺激引起后，交感神经系统兴奋，胰岛素分泌减少，肾上腺素、去甲肾上腺素、胰高血糖素、促肾上腺皮质激素、肾上腺皮质激素、抗利尿激素均分泌增加。由于处理葡萄糖代谢最主要的激素——胰岛素分泌减少，所以应激状态下机体处理葡萄糖能力应该是降低的。

5.某术后化疗患者，一般状况较差。目前患者存在肺部感染和尿潴留。护士对其进行以下哪项操作前须充分告知并签订知情同意书

- A.晨间护理
- B.静脉输液
- C.皮试
- D.留置导尿
- E.锁骨下静脉穿刺置管

答案：E

解析：术后化疗患者存在肺部感染和尿潴留，晨间护理、导尿、静脉输液以及皮试属于正常治疗护理，不需要特殊知情同意。而锁骨下静脉穿刺置管属于有创性手术操作，护士在操作前应征得患者同意之情后方能操作。

6.8个月男婴，在社区准备接种麻疹疫苗。护士为其消毒时，应采用的消毒剂是

- A.2%碘酊
- B.0.5%碘伏
- C.0.9%生理盐水
- D.75%乙醇
- E.90%乙醇

答案：D

解析：麻疹疫苗的注射方法为：上臂外侧三角肌附着处皮肤用75%乙醇消毒，待干后皮下注射0.5ml。儿童和成人剂量相同。

7.导致肺动脉高压形成的最重要因素是

- A.肺血管床减少
- B.缺氧性肺血管收缩
- C.血液黏稠度增加
- D.血容量增多
- E.心脏负荷增加

答案：B

解析：肺动脉高压的形成，是肺心病发生的关键环节，缺氧和二氧化碳潴留可导致肺血管收缩，缺氧是肺动脉高压形成的关键。

8.盆腔炎病人应采取半坐卧位，其目的是

- A.借助于重力作用使膈肌位置下降
- B.促使感染局限化，减少中毒反应
- C.促进渗出性物质的吸收
- D.减轻腹部疼痛
- E.减少局部充血正确

答案：B

解析：半坐卧位适用于胸、腹、盆腔手术后或有炎症的病人。原因：1.腹腔渗出液可流入盆腔，使感染局限化，2 防止感染向上蔓延引起膈下脓肿。

9. 患者，29 岁，因车祸导致腰椎骨折，搬运患者的正确方法应选择

- A. 一人法
- B. 二人法
- C. 三人法
- D. 四人法
- E. 挪动法正确

【答案】D

10. 铺麻醉床操作，错误的步骤是

- A. 换铺清洁被单
- B. 按要求将橡胶单和中单铺于床头. 床中部
- C. 盖被纵向三折于门同侧床边
- D. 枕横立于床头，开口背门
- E. 椅子置于门对侧床边

答案:C

解析:根据病情铺同侧橡胶单、中单,先铺床中部;如需铺在床头,应对齐床中线,上端与床头平齐,下端压在中部橡胶单和中单上,下垂部分平整地塞入床垫下。如铺在床尾,下端与床尾平齐。转至对侧,同法铺好大单.橡胶单、中单,逐层拉紧平塞于床垫下。同备用床法套好被套,系好带;盖被两侧边缘向内反折与床沿平齐,上端与床头平齐,尾端向内折与床尾平齐;将盖被纵向呈扇形三折于床的一侧,开口向门。同备用床法套好枕套,将枕头横立于床头开口背门。

11. 早产儿适宜的温度

- A. 18℃~20℃
- B. 20℃~22℃
- C. 22℃~24℃
- D. 24℃~26℃
- E. 26℃~28℃

答案:D

解析:一般病室适宜的温度为 18~22℃;新生儿室、手术室、产房、老年病房等,室温调高至 22~24℃ 为宜。病室相对湿度以 50%~60%为宜。

12. 患者男,68 岁。因患膀胱癌住院,入院时,护士主动与其交流:“您好,我是您的责任护士,有事请找我”。患者治疗多日病情不见好转,情绪低落,化疗不良反应较重。护士悉心照顾,鼓励,患者深受感动。患者经治疗后即将出院,对护士的服务非常满意。该责任护士与该患者的关系模式属于

- A. 共同参与型
- B. 主动被动型
- C. 指导-合作型
- D. 自主-合作型
- E. 被动-主动型

答案:A

解析:题干中护士指导患者应该怎样做,对患者进行教育和指导,同时患者接受护士的指导并合作,即共同参与型,多见于慢性疾患。

13. 患者,女性,30 岁,有滴虫性阴道炎。近 3 个月来月经周期紊乱,前来咨询避孕措施。最

佳的选择是

- A. 口服避孕药
- B. 长效避孕药
- C. 自然避孕法
- D. 阴茎套
- E. 紧急避孕药

答案:D

解析:男用阴茎套避孕的原理是利用工具阻止精子进入阴道或子宫腔,且具有防止性疾病传播的作用。

14. 临时备用医嘱的有效时间是

- A. 6h
- B. 8h
- C. 10h
- D. 12h
- E. 24h

答案:D

解析:临时备用医嘱仅在医生开写医嘱起 12h 内有效,必要时用,过时尚未执行则失效

15. 煮沸消毒时,为增强杀菌可在水中加入

- A. 5%~10%硫代硫酸钠
- B. 3%~4%对氨基水杨酸钠
- C. 4.5%~5%亚硝酸钠
- D. 1%~2%碳酸氢钠
- E. 0.1%~0.25%苯妥英钠

答案:D

解析:加入 1%~2%碳酸氢钠,沸点可达到 105℃,除增强杀菌作用外,还有去污防锈的作用。

16. 下列表现符合间歇热的是

- A. 体温持续升高至 39~40℃,持续数日。
- B. 24 小时内变化不规则
- C. 高热与正常体温交替出现
- D. 体温在 39℃以上,24 小时波动超过 1℃,最低体温超过正常水平
- E. 体温持续升高至 39~40℃,24 小时波动不超过 1℃

答案:C

解析:间歇热表现为高热与正常体温交替有规律地反复出现,发热时体温骤升达 39℃以上,持续数小时或几天不等,然后很快下降至正常,经数小时.数天的间歇后,又再次发作。选项 A、E 是稽留热的表现,选项 D 是弛张热的表现选项 B 是不规则热的表现。

17 属于治疗饮食的是

- A 要素饮食
- B 软质饮食
- C 流质饮食
- D.胆囊造影饮食
- E 吸碘试验饮食

答案 A

解析基本饮食包括普通饮食、软质饮食半流质饮食、流质饮食。医院治疗饮食包括高热量饮

食、高蛋白饮食、低蛋白饮食、低脂肪饮食、低盐饮食、无盐低钠饮食、少渣饮食、高膳食纤维饮食、低胆固醇饮食、要素饮食。试验饮食包括胆囊造影饮食、潜血试验饮食、吸碘试验饮食。

18. 下列病人使用热水袋时,水温可以是60~70C 的是

- A 昏迷病人
- B 瘫痪病人
- C 婴幼儿病人
- D 老年病人
- E 神志清醒的青年人

答案 E

解析用热水袋时,若为婴幼儿老人麻醉未清醒昏迷末梢循环不良者,水温应调至 50C 以内,以免烫伤。

19 大量不保留灌肠的禁忌证,不包括

- A 妊娠
- B 急性腹膜炎
- C 消化道出血
- D 肠穿孔
- E 外痔

答案 E

解析大量不保留灌肠的禁忌证包括急腹症、妊娠、消化道出血、严重心血管疾病等 20 溶血反应发生时,护士首先应

- A 立即停止输血
- B 通知医生
- C 静脉滴注 4%碳酸氢钠
- D 测量血压及尿量
- E 皮下注射肾上腺素

答案 A

21 采集粪便标本检查阿米巴原虫前,将便盆加热的目的是

- A 减少污染
- B 保持原虫活力
- C 降低假阳性率
- D 降低假阴性率
- E 使患者舒适

答案 B

解析检查阿米巴原虫,采集标本前,应先将便盆加温,再嘱患者排便,并连同便盆立即送检,以保持阿米巴原虫的活动状态,因阿米巴原虫在低温环境中失去活力,而难以查找

22 代谢性酸中毒病人的典型症状是

- A 呼吸浅而慢
- B 呼吸浅而快
- C 呼吸深而慢

- D 呼吸急促
- E 呼吸深而快

答案 E

解析代谢性酸中毒病人呼吸深而快,有时呼气有酮味。

23.进行尸体护理,下列做法不妥的是

- A.置尸体去枕平卧
- B.装上活动假牙
- C.必要时用绷带托扶下颌
- D.有伤口者要更换敷料
- E.各孔道用棉花填塞

答案: A

解析:尸体料理的主要目的是使尸体整洁,姿势良好,给病人家属以心理安慰。因此,尸体料理时应将尸体仰卧,头下垫一枕,防止面部变色;有伤口者更换敷料:给尸体清洁面部,如有义齿代为装上,口不能闭紧者,轻揉下颌,或用绷带托住;必要时用棉花垫塞口、鼻、耳、阴道、肛门等孔道,以免液体外溢。

[24-25 题共用题干]

患者,女,67岁,患肺源性心脏病。表现为呼吸困难,喉中有痰,不易咳出。患者家离医院较远,家人探视少,患者因此焦虑,无人时常哭泣。

24.护理该患者首先应解决的问题是

- A.清理呼吸道无效
- B.皮肤完整性受损
- C.语言沟通障碍
- D.活动无耐力
- E.便秘

答案: A

解析:该患者呼吸困难,痰中有痰且不易咳出,故首先的护理问题是清理呼吸道无效。

25.除解决上述问题外,护士还应注意满足患者

- A.生理的需要
- B.安全的需要
- C.爱与归属感的需要
- D.尊敬的需要
- E.自我实现的需要

答案: C

解析:按马斯洛的人类基本需要层次论进行排序,优先解决生理需要,并且应将生理功能平衡状态威胁最大的问题排在最前面;在无原则冲突的情况下,可考虑患者认为最重要的问题予以优先解决,根据马斯洛的需要层次理论,此时患者对于爱与归属感的需要最强烈。