

-
- 1.大量出汗时尿量减少，主要原因是
- A.血浆胶体渗透压升高，导致肾小球滤过减少
 - B.血浆晶体渗透压升高，引起 ADH 分泌增多
 - C.血容量减少，导致肾小球滤过减少
 - D.交感神经兴奋，引起肾小球滤过减少
 - E.肾素-血管紧张素系统活动增强，引起醛固酮分泌增多

- 2.神经细胞、肌细胞、腺细胞兴奋时，其共有的特征是
- A.分泌生物活性物质
 - B.蛋白质合成增加
 - C.动作电位
 - D.收缩反应
 - E.第二信使浓度增高

- 3.可承载生物遗传信息的分子结构是
- A.多不饱和脂肪酸的双键位置
 - B.氨基酸的侧链基因
 - C.脂蛋白的脂质组成
 - D.核酸的核苷酸序列
 - E.胆固醇的侧链碳原子

- 4.参与氧化脱氨基的是
- A.天冬氨酸转氨酶
 - B.乳酸脱氢酶
 - C.HMG-CoA 还原酶
 - D.丙酮酸羧化酶
 - E.琥珀酰 CoA 转硫酶

- 5.按一级消除动力学的消除规律，体内药物基本消除干净需
- A.1 个 $t_{1/2}$
 - B.2 个 $t_{1/2}$
 - C.5 个 $t_{1/2}$
 - D.8 个 $t_{1/2}$
 - E.无法确定，同用药剂量大小有关

- 6.用了阿托品后，会引起以下哪些药理作用
- A.皮肤血管扩张
 - B.腺体分泌增加
 - C.内脏平滑肌收缩
 - D.较大剂量使心率减慢
 - E.针尖样瞳孔

- 7.用于支气管哮喘治疗时，异丙肾上腺素和肾上腺素作用机制不同的是



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



-
- A.激动 β_2 受体
 - B.舒张支气管平滑肌
 - C.抑制组胺释放
 - D.收缩支气管黏膜血管
 - E.改善通气功能

8.下列临床疾病中，一般不用酚妥拉明的是

- A.血栓闭塞性脉管炎
- B.嗜铬细胞瘤
- C.突然停用可乐定引发的高血压危象
- D.过敏性休克
- E.去甲肾上腺素滴注外漏所致皮肤缺血疼痛

9.既可以抗心律失常，又可以治疗癫痫大发作的药物是

- A.卡马西平
- B.乙琥胺
- C.扑米酮
- D.苯巴比妥
- E.苯妥英钠

10.细胞胞质内出现大小不等、圆形均质红染物质的病变，见于

- A.纤维化肾小球
- B.纤维瘢痕组织
- C.高血压病时细动脉
- D.动脉粥样硬化的纤维斑块
- E.肾小球肾炎时的肾小管

11.炎症细胞自血管内游出,向组织炎症区域定向运动的现象称

- A.炎性浸润
- B.炎性渗出
- C.炎性漏出
- D.趋化作用
- E.阿米巴样运动

12.门脉性肝硬化形成假小叶，其病理特点不正确的是

- A.肝细胞排列紊乱
- B.肝细胞体积大，核大深染，可有双核出现
- C.肝细胞可变性坏死
- D.小胆管闭塞、缺如
- E.中央静脉可偏位、缺如

13.经注册的执业助理医师独立从事一般职业活动可在

- A.私立医院



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



- B.教学医院
- C.市级医院
- D.乡卫生院
- E.县级医院

14.《执业医师法》规定，对医师的业务水平、工作成绩和职业道德状况进行定期考核的机构应是

- A.县级以上卫生行政部门
- B.县级以上疾病预防控制中心
- C.三甲级以上综合医院专家组
- D.县级以上卫生行政部门委托的机构或组织
- E.医师所在地的医学会或者医师协会

15.某感冒患者，肌内注射链霉素后不久，因药物过敏而死亡。家属认为医院未做皮试就注射药物，是院方责任。根据《医疗事故处理办法》，此事应定义为

- A.医疗责任事故
- B.医疗技术事故
- C.严重医疗差错
- D.医疗意外
- E.技术瓶颈

16.外国驻华领事馆疑有传染病疫情时，有权实施预防控制措施的机构是

- A.我国卫生检验检疫机构
- B.我国疾病预防控制机构
- C.该国卫生检验检疫机构
- D.该国疾病预防控制机构
- E.国际疾病预防控制组织

17.可设立血库的医院等级是

- A.三级甲等以上
- B.三级乙等以上
- C.二级以上
- D.二级以下
- E.一级以上

18.医疗机构暂时贮存医疗废物的时间不得超过

- A.1天
- B.2天
- C.3天
- D.4天
- E.5天

19.心身疾病的产生与患者的错误信念和错误的认知思维方法有关。持这种观点的学者是



-
- A.罗杰斯
 - B.坎农
 - C.贝克
 - D.华生
 - E.弗洛伊德

20.知觉不具有的特征是

- A.整体性
- B.恒常性
- C.倾向性
- D.选择性
- E.理解性

21.根据霍尔姆斯和雷赫生活事件评分,年内累计为150~300分,则今后两年内发生重大疾病的概率是

- A.20%
- B.30%
- C.40%
- D.50%
- E.60%

22.女,19岁。从偏远山区考入大学,因恐惧汽车而不敢在马路上行走,来心理门诊就诊。最适宜的行为治疗方法是

- A.冲击疗法
- B.厌恶治疗
- C.生物反馈
- D.放松训练
- E.系统脱敏

23.医患交往过程中,病人对医嘱的执行率称为

- A.依从性
- B.效果指数
- C.非技术交往
- D.技术交往
- E.协作性

24.心理护理的程序不包括

- A.评估
- B.诊断
- C.计划
- D.实施
- E.反馈



25. 嘌呤核苷酸从头合成的直接原料不包括

- A. 一碳单位
- B. 谷氨酰胺
- C. 天冬酰胺
- D. 甘氨酸
- E. CO₂

26. 下列属于蛋白质分子 α -螺旋特点的是

- A. 左手螺旋
- B. 每一螺旋含 3.6 个氨基酸残
- C. 结构中必须含有脯氨酸
- D. 氨基酸侧链伸向螺旋内侧
- E. 主要靠范德华力维持空间构象

27. 构成多聚核苷酸的骨架成分是

- A. 碱基与戊糖
- B. 碱基与磷酸
- C. 嘌呤与嘧啶
- D. 磷酸与核苷
- E. 戊糖与磷酸

28. 男, 2 岁。腹膜后肿块 5 个月。直径 3cm, 病理诊断为恶性肿瘤, 最可能的肿瘤是

- A. 错构瘤
- B. 神经鞘膜瘤
- C. 神经母细胞瘤
- D. 囊性畸胎瘤
- E. 平滑肌肉瘤

29. 镜下见既有肝细胞大片坏死, 又有肝细胞结节状再生, 病变符合

- A. 急性普通型肝炎
- B. 中度慢性肝炎
- C. 重度慢性肝炎
- D. 急性重型肝炎
- E. 亚急性重型肝炎

30. 进行统计学检验, 建立无效假设应是

- A. $H_0: p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = p_5$
- B. $H_0: p_1 = p_2 = p_3 = p_4 > p_5$
- C. $H_0: \pi_1 = \pi_2 \neq \pi_3 = \pi_4 = \pi_5$
- D. $H_0: \pi_1 \neq \pi_2 \neq \pi_3 \neq \pi_4 \neq \pi_5$
- E. $H_0: \pi_1 = \pi_2 = \pi_3 = \pi_4 = \pi_5$

31. 某社区医务人员拟于 2019 年 6 月对社区内 45 岁以上居民高血压患病情况进行调查。



应采用的研究方法是

- A.横断面研究
- B.队列研究
- C.病例对照研究
- D.生态学研究
- E.个案调查

32.流行病学研究中偏倚的分类包括

- A.选择偏倚，混杂偏倚，测量偏倚
- B.选择偏倚，信息偏倚，混杂偏倚
- C.选择偏倚，信息偏倚，测量偏倚
- D.回忆偏倚，报告偏倚，测量偏倚
- E.入院率偏倚，易感性偏倚，无应答偏倚

33.临床预防服务的主要内容不包括

- A.健康咨询
- B.筛查
- C.药物治疗
- D.化学预防
- E.免疫接种

34.维生素 A 缺乏常见临床表现中，不包括

- A.暗适应能力下降
- B.夜盲症
- C.毕脱斑
- D.皮肤干燥
- E.柯氏斑

35.光化学烟雾主要来源于

- A.CO.NO.
- B.HS.CO
- C.氮氧化合物
- D.醛类、酮类
- E.烃类、醛类

36.对职业人群进行医学检查和医学实验，以确定其处在职业危害中是否出现职业性疾病，称为

- A.职业环境监测
- B.职业诊疗康复
- C.职业医学监护
- D.职业信息管理
- E.职业病管理



金英杰医学
JINYINGJIE.COM



37.对恶性肿瘤病人实施第二级预防的目的是

- A.延长患者生命
- B.减轻患者痛苦
- C.提高生存质量
- D.降低肿瘤死亡率
- E.降低肿瘤发病率

38.抽样误差来源于

- A.仪器未进行归零校正
- B.抽样方法不科学
- C.样本含量过小
- D.标准试剂校准不好
- E.个体之间存在差异

39.假设检验的实质是

- A.由样本统计量估计总体参数
- B.判断“差别”是由抽样误差引起还是总体上的不同
- C.使用不同的检验统计量更加科学地描述样本资料
- D.研究观察值之间的变异程度
- E.确定医学参考值范围

40.某企业 1 周内发生伤寒病人 24 例，罹患率为 17%，该疾病的流行强度属于

- A.散发
- B.流行
- C.大流行
- D.暴发
- E.局部流行

41.男，32 岁。持续性头痛 6 天，自觉后枕部紧箍样疼痛，无恶心、畏声和畏光。查体：T36.5℃，BP 120/70mmHg，眼压无异常，张口颞颌关节无弹响，双颞肌和枕肌明显压痛，余神经系统检查无异常。脑 MRI 无异常。最可能的诊断是

- A.颈椎病
- B.血管性头痛
- C.紧张性头痛
- D.无先兆偏头痛
- E.颞颌关节紊乱

42.高血压所致脑出血最容易破裂的血管为

- A.大脑中动脉
- B.大脑基底动脉脑桥支
- C.豆纹动脉
- D.内囊动脉
- E.大脑后动脉丘脑支



43.以下可以提示红细胞破坏增加的检查是

- A.网织红细胞计数升高
- B.血清结合珠蛋白降低
- C.外周血涂片可见有核红细胞
- D.骨髓检查见红系增生旺盛
- E.骨髓检查见粒红比例降低

44.血管内溶血和血管外溶血最主要的鉴别是

- A.有无黄疸
- B.有无血红蛋白尿
- C.有无头痛
- D.有无血胆红素升高
- E.有无网织红细胞计数升高

45.男,22岁。2周来发热,伴皮肤瘀点瘀斑。血常规示全血细胞减少;骨髓检查示增生极度活跃,幼红细胞50%,原始细胞占骨髓NEC的40%。诊断为急性白血病,其FAB分型是

- A.M3
- B.M4
- C.M5
- D.M6
- E.M7

46.急淋联合化疗获得完全缓解后复发,最常见部位是

- A.骨髓
- B.睾丸
- C.眼部
- D.关节
- E.中枢神经系统

47.急性痛风性关节炎最常累及

- A.第1掌指关节
- B.第1跖趾关节
- C.第1近端指间关节
- D.单侧腕关节
- E.单侧踝关节

48.类风湿关节炎患者最早出现的症状多为

- A.近端指间关节痛
- B.远端指间关节痛
- C.近端指间关节畸形
- D.远端指间关节畸形
- E.晨僵



49.男，74岁。因前列腺增生行经尿道前列腺切除术，术后病理显示前列腺外周带局限性高分化癌，癌组织体积<手术标本体积5%，直肠指检正常。该患者最适宜的治疗是

- A.观察随访
- B.前列腺部分切除术
- C.根治性前列腺切除术
- D.睾丸切除术
- E.外放射治疗

50.男，60岁。1月前从高处落下致腰部受伤，后出现排尿困难、夜尿频多，常有尿失禁。查体:会阴部皮肤感觉减退。直肠指检未见前列腺增大。B超检查,可见膀胱残余尿量约60ml,双肾积水。静脉尿路造影显示:上尿路扩张积水,膀胱呈“圣诞树”形。血清PSA3.0ng/ml。最可能的诊断为

- A.良性前列腺增生
- B.前列腺癌
- C.膀胱颈挛缩
- D.尿道狭窄
- E.神经源性膀胱功能障碍



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

更多免费资料领取在等你

