

走更远的路，才能看到更多的风景  
爬更高的山，才能获得不同的视角



## ● 理想牙刷具有的特点中，除外

- A、吸水性好
- B、回弹力好
- C、易洗涤和干燥
- D、刷毛顶端磨圆钝
- E、牙刷柄具有防滑设计

**【正确答案】** A

## ● 正确保管牙刷的方法为

- A、刷牙后要用清水多次冲洗牙刷
- B、牙刷置于通风处充分干燥
- C、刷毛上的水分甩干
- D、不可浸泡在沸水中
- E、以上均正确

**【正确答案】** E

## ● 尼龙丝刷毛的优点不包括哪一项

- A、毛端呈圆形，对牙清洁作用及牙的按摩作用均佳
- B、弹性好
- C、耐磨
- D、吸水性差

E、高温下不易卷毛

**【正确答案】** E

## ● 适合婴儿使用的牙刷是

A、电动牙刷

B、指套牙刷

C、单束毛牙刷

D、小插刷

E、丝柄刷

**【正确答案】** B

## ● 定期 X 线定期追踪观察属于牙周病预防的<sup>®</sup>

A、基本急诊保健

B、初级预防

C、一级预防

D、二级预防

E、三级预防

**【正确答案】** D

## ● 胶粘剂约占牙膏含量的

A、1%~2%

B、2%~4%

C、20%~40%

D、20%~60%

E、0.1%~0.5%

**【正确答案】** A

## ● 润湿剂约占牙膏含量的

- A、1% ~ 2%
- B、2% ~ 4%
- C、20% ~ 40%
- D、20% ~ 60%
- E、0.1% ~ 0.5%

**【正确答案】** C

### ● 表面活性剂又称为

- A、洁净剂
- B、润湿剂
- C、摩擦剂
- D、胶粘剂
- E、防腐剂

**【正确答案】** A

### ● 洁净剂约占牙膏含量的

- A、1% ~ 2%
- B、2% ~ 4%
- C、20% ~ 40%
- D、20% ~ 60%
- E、0.1% ~ 0.5%

**【正确答案】** A

### ● 摩擦剂约占牙膏含量的

- A、1% ~ 2%
- B、2% ~ 3%
- C、20% ~ 40%
- D、20% ~ 60%

E、0.1%~0.5%

**【正确答案】** D

## ● 成人每次刷牙牙膏用量为

A、大约 1g、长度约 1cm

B、大约 1g、长度约 2cm

C、大约 2g、长度约 1cm

D、大约 2g、长度约 2cm

E、大约 3g、长度约 2cm

**【正确答案】** A

## ● 长期使用会造成牙色素沉积的药物牙膏是<sup>®</sup>

A、全效牙膏

B、洗必泰牙膏

C、脱敏牙膏

D、氟化亚锡牙膏

E、增白牙膏

**【正确答案】** B

## ● 脱敏牙膏有效成份

A、20%二氧化硅

B、氟化亚锡

C、0.321%氟化钠

D、中草药成分

E、三氯羟苯醚

**【正确答案】** B

## ● 牙膏中起降低表面张力、增进清洁效果作用的成分是

- A、摩擦剂
- B、洁净剂
- C、润湿剂
- D、芳香剂
- E、防腐剂

**【正确答案】** B

● **建议普通人群每次刷牙时间至少为**

- A、1 分钟
- B、2 分钟
- C、3 分钟
- D、4 分钟
- E、5 分钟

**【正确答案】** B

● **临床研究显示，人们在刷牙的初始 2 分钟内，牙菌斑去除量超过**

- A、65%
- B、75%
- C、80%
- D、95%
- E、99%

**【正确答案】** C

● **为保证刷牙时不遗漏一些部位，每个部位至少刷**

- A、2~3 次
- B、2~5 次
- C、5~10 次

- D、10~15次
- E、15次

**【正确答案】** C

● **刷牙时，将牙刷移至下一个位置放置最佳范围是**

- A、1~2颗牙
- B、2~3颗牙
- C、3~4颗牙
- D、3颗牙
- E、4颗牙

**【正确答案】** B

● **Bass刷牙法又称为**

- A、水平颤动法
- B、旋转刷牙法
- C、圆弧刷牙法
- D、Fones刷牙法
- E、改良的 stillman 刷牙法

**【正确答案】** A

● **为成人推荐的去除牙颈部及龈沟内的菌斑的有效刷牙方法是**

- A、水平颤动法
- B、旋转刷牙法
- C、圆弧刷牙法
- D、Fones刷牙法
- E、改良的 stillman 刷牙法

【正确答案】 A

● 最易为年幼儿童学习理解和掌握的刷牙方法为

- A、水平颤动法
- B、旋转刷牙法
- C、圆弧刷牙法
- D、Bass 刷牙法
- E、改良的 stillman 刷牙法

【正确答案】 C

● Fones 刷牙法又称为

- A、水平颤动法
- B、旋转刷牙法
- C、圆弧刷牙法
- D、横刷牙法
- E、竖刷牙法

【正确答案】 C

● 通过正确的刷牙方法刷牙可以达到的效果主要是

- A、使口气清新
- B、按摩牙龈
- C、促进牙龈组织的血液循环
- D、清除牙菌斑
- E、清除食物残渣

【正确答案】 D

● 刷牙是预防牙周疾病的好方法，下面哪种提法更好些

- A、正确刷牙

- B、早晚刷牙
- C、认真刷牙
- D、有效刷牙
- E、饭后刷牙

**【正确答案】** D

## ● 刷牙不易清洁的部位是

- A、牙颈部
- B、邻接面
- C、后牙远中面
- D、下前牙舌侧
- E、上后牙颊侧

**【正确答案】** B

## ● 简化口腔卫生指数(OHI-S)需检查牙面数为

- A、4个牙面
- B、6个牙面
- C、4个舌面
- D、6个舌面
- E、2个唇(颊)面

**【正确答案】** B

## ● 简化口腔卫生指数(OHI-S)需要检查的牙面是

- A、21、11、31、41的唇(颊)面，36、46的舌面
- B、16、11、26、21的唇(颊)面，36、46的舌面
- C、16、11、26、31的唇(颊)面，36、46的舌面
- D、16、26、46、46的唇(颊)面，11、31的舌面
- E、16、11、26、31的唇(颊)面，21、41的舌面



【正确答案】 C

● 有关简化口腔卫生指数的检查方法中，错误的一项是

- A、检查软垢以视诊为主
- B、检查牙石时探针从近中面沿着龈沟向远中移动
- C、视诊困难时可自牙切缘 1/3 处向颈部轻刮
- D、每个牙面软垢或牙石记分相加，即为个人简化口腔卫生指数
- E、根据软垢面积按标准记分

【正确答案】 B

● 以下关于 OHI-S 的叙述，错误的是

- A、包括 DI-S 和 CI-S
- B、OHI-S 为简化口腔卫生指数
- C、检查软垢以视诊为主
- D、包括简化软垢指数和简化牙石指数
- E、不可用于个人

【正确答案】 E

● 简化口腔卫生指数要检查

- A、全口牙
- B、半口牙
- C、前牙唇侧
- D、6 颗指数牙
- E、后牙舌侧

【正确答案】 D

● 龈缘区的牙面有薄的菌斑，但视诊不可见，若用探针尖刮牙面可见牙菌斑，PLI 记分为

- A、0
- B、1
- C、2
- D、3
- E、4

**【正确答案】** B

● 以下关于菌斑指数(PLI)的叙述中，不正确的是

- A、根据菌斑覆盖面积记分
- B、用视诊结合探针的方法检查
- C、可检查选定的几颗牙
- D、每颗牙检查4个牙面
- E、用于评价口腔卫生状况和衡量牙周病防治效果

**【正确答案】** A

● 菌斑百分率在多少以下时可认为菌斑被基本控制

- A、10%
- B、20%
- C、30%
- D、40%
- E、45%

**【正确答案】** B

● 以下选项中属于牙周疾病的三级预防的是

- A、牙列缺失可摘局部义齿修复，重建功能
- B、去除菌斑和其他刺激因子
- C、正确刷牙、定期口腔保健，维护口腔健康
- D、X线定期追踪观察牙槽骨情况，采取适当的治疗

E、早发现、早治疗，减轻牙周病的严重程度

**【正确答案】** A

## ● 牙周病的流行特征的描述中，错误的是

A、发展中国家的龈炎、牙石等的患病程度高于发达国家

B、牙周病患病率随年龄增长而增高

C、农村居民的患病程度高于城市居民

D、多数报告为男性重于女性

E、与民族无关系

**【正确答案】** E

## ● 社区人群牙周健康的重要判断标准是

A、牙龈点彩消失

B、牙龈颜色异常

C、牙龈红肿

D、牙龈出血

E、牙周袋溢脓

**【正确答案】** D

在为社区居民进行刷牙指导时，口腔医师指出应使用保健牙刷，并告诉人们

A、磨圆的刷毛端比平切刷毛端对牙龈损伤更小

B、尼龙丝刷毛遇高温不易卷曲

C、天然鬃毛容易干燥、耐磨损

D、刷牙后应将刷头向下放在口杯中

E、空气干燥法是清除牙刷细菌最完善的方法

**【正确答案】** A

## ● 不属于氯己定的副作用表现的是

- A、树脂类修复体龈 1/3 处易染成棕黄色
- B、可使牙、舌背上发生染色
- C、染色沉积在牙表面
- D、对口腔黏膜有轻度的刺激作用
- E、染色不能通过打磨、刷牙方法去除

**【正确答案】** E

## ● 季铵化合物的特性，除外

- A、对革兰阳性菌有较强的杀灭作用
- B、对革兰阴性细菌无效
- C、长期使用可能出现牙染色
- D、制剂在口腔内很快被清除，不能保持疗效
- E、长久使用可促进牙结石的形成

**【正确答案】** B

## ● 关于香精油的下列描述中，不正确的是

- A、主要为麝香草酚、薄荷醇和甲基水杨酸盐混合而成
- B、主要用作漱口剂
- C、能清除菌斑中的内毒素
- D、又称酚类化合物
- E、可提高菌斑的毒性

**【正确答案】** E

## ● 0.12%或 0.2%氯己定液含漱的正确使用方法是

- A、每天 1 次，每次 10ml，每次 1 分钟
- B、每天 1 次，每次 20ml，每次 1 分钟

- C、每天 2 次，每次 10ml，每次 1 分钟
- D、每天 2 次，每次 20ml，每次 1 分钟
- E、每天 3 次，每次 10ml，每次 1 分钟

**【正确答案】** C

## ● 操作简便，重复性好，适合于大规模的口腔流行病学调查的指数是

- A、简化口腔卫生指数
- B、Q-H 菌斑指数
- C、GI
- D、SBI
- E、CPI

**【正确答案】** E

## ● 不属于社区牙周指数检查方法描述的是

- A、每个区段内必须有 2 颗或 2 颗以上功能牙
- B、缺失一颗指数牙或有拔牙指征，则只检查另一颗指数牙
- C、一个区段内有拔牙指征，则该区段不检查，记为 X
- D、每个区段两颗功能牙检查结果，以最重情况记分
- E、6 个区段中最高的记分作为个人 CPI 值

**【正确答案】** C

## ● 以下关于 CPI 检查指数牙的描述，不恰当的是

- A、20 岁以上者需要检查以下 10 颗指数牙
- B、20 岁以上者检查牙龈出血、牙石和牙周袋情况
- C、15 岁以下者，检查 6 颗指数牙
- D、20 岁以下，15 岁以上者，检查 8 颗指数牙
- E、15 岁以下者检查牙龈出血和牙石情况，不检查牙周袋深度

【正确答案】 D

● 下列关于 CPI 探针检查方法的描述中，不恰当的是

- A、探诊为主，结合视诊
- B、探针与牙长轴平行，紧贴牙根
- C、沿龈沟从远中向近中移动，作上下短距离的颤动
- D、探诊时所用的力不超过 30g
- E、探针轻缓地插入龈沟或牙周袋内

【正确答案】 D

● 不属于 CPI 探针作用的是

- A、检查牙龈出血情况
- B、探测龈下牙石
- C、测牙龈沟深度
- D、检查菌斑附着厚度
- E、测牙周袋的深度

【正确答案】 D

● CPI 指数为 2 时，是指

- A、探诊有牙石，但探针黑色部分全部露在龈袋外
- B、牙龈健康
- C、牙龈炎，探诊后出血
- D、早期牙周病，龈袋深度 4~5mm
- E、晚期牙周病，牙周袋深度 6mm 或以上

【正确答案】 A

● 社区牙周指数不包括下面哪一项检查

- A、牙龈出血

- B、牙结石
- C、牙槽骨吸收
- D、浅牙周袋
- E、深牙周袋

**【正确答案】** C

● 在进行牙周病流行病学调查时，WHO 推荐使用

- A、牙龈指数
- B、龈沟出血指数
- C、简化口腔卫生指数
- D、菌斑指数
- E、社区牙周指数

**【正确答案】** E

● 下列有关牙周病二级预防的叙述中，除外的是

- A、专业性洁治
- B、刮治
- C、口腔健康教育和指导
- D、早发现、早治疗，减轻牙周病的严重程度
- E、X 线定期追踪观察牙槽骨情况

**【正确答案】** C