

# 2020临床执业（助理）医师资格考试

## 网友回忆版（执业）



关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

# 第一单元

## A1 型选择题 (1—70 题)

### 答 题 说 明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 属于非特异性免疫的是
  - 致敏 T 淋巴细胞
  - IgG 抗体
  - IgM 抗体
  - IgE 抗体
  - 单核-巨噬细胞
- 发现早期肺结核的主要方法是
  - 查痰抗酸杆菌
  - 胸部 X 线检查
  - 胸部 CT 检查
  - 血沉检查
  - 血清特异性抗体检查
- 中毒后临床表现为双侧瞳孔散大的毒物是
  - 吗啡
  - 氯丙嗪
  - 阿托品
  - 阿片类药物
  - 有机磷杀虫药
- 骨髓象常见病态造血的是
  - 再生障碍性贫血
  - 慢性失血所致
  - 叶酸缺乏
  - 维生素 B<sub>12</sub> 缺乏
  - 骨髓增生异常综合征
- 下列不属于心身疾病的是
  - 精神分裂症
  - 冠心病
  - 消化性溃疡
  - 糖尿病
  - 高血压
- 甲型肝炎病毒的主要传播途径是
  - 母婴传播
  - 粪口传播
  - 性传播
  - 空气传播
  - 接触传播
- 在直肠息肉中,下列哪种癌变率最高
  - 管状腺瘤
  - 儿童性息肉
  - 炎性息肉
  - 绒毛状腺瘤
  - 混合性腺瘤
- 病毒感染机体后,在体内由局部向远处扩散的方式不包括
  - 沿神经播散
  - 经血行播散
  - 经淋巴播散
  - 经组织间隙播散
  - 经免疫系统播散
- 下列乳腺癌类型中常表现为粉刺癌的是
  - 浸润性小叶癌
  - 浸润性导管癌
  - 导管内原位癌
  - 小叶原位癌
  - 髓样癌
- “入芝兰之室,久而不闻其香”说明的是
  - 感觉相互作用
  - 感觉适应
  - 感觉过敏
  - 感觉减退
  - 感觉补偿
- 右肾下极切除术后需要缝合的是
  - 后腹膜
  - 纤维膜

- C. 脂肪囊  
D. 肾筋膜  
E. 壁腹膜
12. 金黄色葡萄球菌所致尿路感染的主要感染途径是  
A. 上行感染  
B. 淋巴道感染  
C. 性接触感染  
D. 血行感染  
E. 直接感染
13. 丙型肝炎病毒(HCV)的主要传播途径是  
A. 消化道传播  
B. 输血传播  
C. 虫媒传播  
D. 呼吸道传播  
E. 直接接触传播
14. 右心衰最有意义的表现是  
A. 颈静脉怒张  
B. 双下肢水肿  
C. 肝颈静脉回流征阳性  
D. 肺动脉第二心音亢进  
E. 三尖瓣区杂音
15. 为描述新冠肺炎病毒患者工作构成比的资料,宜选用  
A. 直条图  
B. 散点图  
C. 圆图  
D. 直方图  
E. 线图
16. 医院获得性肺炎中,病原体进入肺组织引发肺炎最主要感染途径是  
A. 飞沫(气溶胶)吸入  
B. 血源性播散  
C. 接触传播  
D. 口咽分泌物吸入  
E. 污染空气吸入
17. 合成血红素的关键酶是  
A. ALA 合酶  
B. 葡萄糖激酶  
C. 丙酮酸激酶  
D. HMG - COA 裂解酶  
E. 异柠檬酸脱氢酶
18. 缺氧引起呼吸加深加快的原因是  
A. 直接刺激呼吸中枢  
B. 刺激中枢化学感受器  
C. 刺激外周化学感受器  
D. 刺激呼吸肌  
E. 通过肺牵张反射
19. 血浆凝固酶是金黄色葡萄球菌产生的侵袭性酶,其主要不包括  
A. 有助于感染扩散  
B. 抗吞噬  
C. 特异识别作用  
D. 菌种鉴别  
E. 刺激产生抗体
20. 成人每周应至少参加多少分钟中等强度的身体活动  
A. 90  
B. 120  
C. 150  
D. 200  
E. 250
21. 不属于腹膜内器官的是  
A. 阑尾  
B. 回肠  
C. 横结肠  
D. 十二指肠降部  
E. 乙状结肠
22. 主要调节甲状旁腺激素分泌的因素是  
A. 血  $1,25 - (\text{OH})_2 - \text{维生素 D}_3$   
B. 血钙  
C. 血镁  
D. 降钙素  
E. 血磷
23. 描述暴发疫情严重性的最佳指标是  
A. 患病率  
B. 续发人数  
C. 发病人数  
D. 罹患率  
E. 患病人数
24. 抗休克治疗中,下列提示微循环改善的指标中,临床上最有意义的是  
A. 脉率减慢  
B. 尿量已达 30ml/h  
C. 肤色转红润  
D. 神志变清楚  
E. 肢端温度上升

- 
25. 下列哪种方式不能预防术后下肢深静脉血栓形成
- 口服阿司匹林
  - 口服华法林
  - 皮下注射低分子肝素
  - 静脉注射大剂量肝素
  - 术后及早下床活动
26. 肾癌的病理表现是
- 切面淡黄色, 彩色
  - 切面灰黑色
  - 在肾上极, 有薄膜
  - 在肾中央
  - 双肾累及, 多个癌肿
27. 受体阻断药可翻转哪种药物的升压作用
- 阿托品 + 毛果芸香碱
  - 阿托品 + 碘解磷定
  - 肾上腺素
  - 去甲肾上腺素
  - 色甘酸钠
28. 桡骨小头半脱位的韧带是
- 环状韧带
  - 桡侧副韧带
  - 环韧带
  - 前臂骨间膜
  - 肱二头肌肌腱
29. 月经周期中, 促进卵泡发育成熟的主要激素是
- 卵泡刺激素
  - 人绒毛膜促性腺激素
  - 黄体生成素
  - 雌激素
  - 孕激素
30. 人类免疫缺陷病毒 (HIV) 在人体内作用的靶细胞是
- $CD_4^+$  T 淋巴细胞
  - $CD_8^+$  T 淋巴细胞
  - 淋巴细胞
  - NK 细胞
  - CTL 细胞
31. 1 型糖尿病患者的胰腺不会出现的病理是
- 胰岛细胞增生
  - 胰岛细胞坏死
  - 间质钙化
  - 间质纤维化
  - 胰岛细胞空泡变性
32. 骑跨伤致尿道损伤的部位是
- 前列腺部
  - 膜部
  - 球部
  - 阴茎部
  - 尿道全部
33. 下列属于补体系统缺陷导致的疾病是
- 急性肾小球肾炎
  - 过敏性休克
  - 接触性皮炎
  - 遗传性血管神经性水肿
  - 桥本甲状腺炎
34. 心理健康的内容不包括
- 人格健全
  - 社会适应
  - 信仰坚定
  - 情绪健康
  - 人际和谐
35. 属于免疫缺陷性疾病的是
- 艾滋病
  - 系统性红斑狼疮
  - 青霉素过敏
  - 风湿性心脏病
  - 接触性皮炎
36. 医患沟通的基本理念是
- 尊重与理解
  - 共同参与
  - 信托关系
  - 同情换位
  - 主动至上
37. 预防感染和局部抗感染治疗使用抗菌药物的原则为
- 使用非限制级抗生素
  - 使用耐药性强抗生素
  - 使用限制级抗生素
  - 使用特殊限制级抗生素
  - 使用不易产生耐药性抗生素
38. 急性肾功能衰竭最常见的原因是
- 急性肾炎
  - 急性间质性肾炎
  - 急进型肾炎
  - 肾动脉栓塞
  - 急性肾小管损伤

39. 常引起心脏毒性的化疗药物是
- 环磷酰胺
  - 甲氨蝶呤
  - 阿霉素
  - 长春新碱
  - 左旋门冬酰胺酶
40. 以下情况予以处罚医院 1 万元罚款的是
- 未对放射诊疗工作人员进行健康检查
  - 科室成员未按照规章制度建立
  - 私自设立科室
  - 各科室人员混乱
  - 未经批准设立放射科
41. 实施化学预防的对象主要是
- 有既往病史
  - 已经康复的
  - 有症状的
  - 无症状的
  - 健康的
42. 病理表现为中性粒细胞浸润的肉芽肿疾病为
- 猫抓病
  - 组织细胞坏死性淋巴结炎
  - 结核性淋巴结炎
  - 结节病
  - 反应性淋巴结炎
43. 正常胎儿的脐带内含有
- 一条脐动脉,一条脐静脉
  - 两条脐动脉,一条脐静脉
  - 两条脐动脉,两条脐静脉
  - 一条脐动脉,两条脐静脉
  - 两条脐动脉
44. 子宫脱垂最主要的病因是
- 盆底组织发育不良
  - 激素水平低落
  - 盆底组织退行性变
  - 分娩损伤
  - 长期腹压增加
45. 前囟凹陷最常见于哪种疾病
- 甲状腺功能减退
  - 维生素 A 中毒
  - 脱水
  - 脑发育不良
  - 头小畸形
46. 提出“人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此”观点的是
- 唐代孙思邈
  - 明代陈实功
  - 东汉张仲景
  - 战国时期扁鹊
  - 清代喻昌
47. 关于正常产褥期临床表现的叙述,正确的是
- 体温在产后 24 小时内一般升高超过 38℃
  - 产后宫缩痛多见于初产妇
  - 产后 1 周以后出现褥汗
  - 产后 1 天子宫底略上升达脐平
  - 产后 14 天子宫底位于脐下两横指
48. 正常情况下,提供儿童总能量 50% ~ 60% 营养素是
- 脂肪
  - 碳水化合物
  - 矿物质
  - 蛋白质
  - 维生素
49. 阴道瘙痒,有豆腐渣样分泌物见于
- 细菌性阴道炎
  - 滴虫性阴道炎
  - 老年性阴道炎
  - 念珠菌阴道炎
  - 淋菌性阴道炎
50. 降低孕产妇死亡率及围生儿死亡率属于
- 孕期保健
  - 生育期保健
  - 产时保健
  - 哺乳期保健
  - 围婚保健
51. 膀胱原位癌的病变是
- 达膀胱深层肌
  - 达膀胱浅层肌
  - 侵犯膀胱壁外组织
  - 限于固有层以内
  - 位于膀胱黏膜层内
52. 乙酰胆碱舒张血管,作用的机制是
- 激动血管内皮细胞 N 受体,促进 NO 释放
  - 激动血管内皮细胞 M<sub>3</sub> 受体,促进 NO 释放
  - 直接松弛血管平滑肌
  - 激动血管平滑肌 α 受体
  - 激动血管平滑肌 β 受体

53. 转氨酶的辅酶是
- 磷酸吡哆醛
  - 焦磷酸硫胺素
  - 生物素
  - 四氢叶酸
  - 泛酸
54. 奥美拉唑的作用机制是
- 阻断壁细胞上的  $H_2$  受体
  - 阻断  $H_1$  受体
  - 保护胃黏膜
  - 促进胃酸分泌
  - 抑制  $H^+ - K^+ - ATP$  酶
55. 对于已经有戒烟意愿的吸烟者应该立即采取的措施是
- 帮助其了解戒烟的危害
  - 宣传戒烟的好处
  - 提供戒烟的药物
  - 帮助确定戒烟日期
  - 安排随访
56. 心境障碍临床类型不包括
- 躁狂发作
  - 恶劣心境障碍
  - 惊恐发作
  - 抑郁发作
  - 环性心境障碍
57. 止血带法止血,总使用时间一般不超过
- 4 小时
  - 1 小时
  - 2 小时
  - 6 小时
  - 8 小时
58. 非侵入性 Hp 检测方法是
- 快速尿素酶
  - PCR
  - Hp 培养
  - $^{13}C$
  - 病理切片
59. 下列何部位损伤,可导致双眼视野颞侧偏盲的是
- 视神经
  - 视觉中枢
  - 视交叉中部
  - 视束
  - 视经盘
60. 下列最易出现脑膜刺激征的是
- 硬膜外出血
  - 脑出血
  - 脑梗死
  - 蛛网膜下腔出血
  - 高血压脑病
61. 颅内少突胶质细胞瘤患者最常见的首发症状是
- 癫痫
  - 头痛
  - 脑积水
  - 恶心和呕吐
  - 视神经盘水肿
62. IgG 与那种补体结合
- $C_9$
  - $C_7$
  - $C_{1q}$
  - $C_3$
  - $C_5$
63. 催化糖原水解生成葡萄糖的酶是
- 6-磷酸葡萄糖脱氢酶
  - 苹果酸脱氢酶
  - 丙酮酸脱氢酶
  - NADH 脱氢酶
  - 葡萄糖-6-磷酸酶
64. 细胞膜内外正常  $Na^+$  和  $K^+$  浓度差的形成与维持是由于
- 膜在安静时对  $K^+$  通透性大
  - 膜在兴奋时对  $Na^+$  通透性增加
  - $Na^+$ 、 $K^+$  易化扩散的结果
  - 细胞膜上  $Na^+ - K^+$  泵的作用
  - 细胞膜上 ATP 的作用
65. 股骨颈骨折 Pauwels 角是指
- 股骨颈长轴线与股骨干纵轴线之间形成的夹角
  - 股骨颈长轴线与股骨颈骨折线之间的夹角
  - 股骨颈骨折线与股骨干纵轴线之间的夹角
  - 股骨颈骨折线与两大转子连线之间的夹角
  - 股骨颈骨折线与两髁嵴连线之间的夹角
66. 免疫标记降钙素阳性的甲状腺肿瘤是
- 梭形细胞癌
  - 滤泡状腺癌
  - 髓样癌
  - 巨细胞癌
  - 乳头状癌

67. 鉴别肾性和中枢性尿崩症的区别是

- A. 测定尿渗透压和血钠
- B. 测定尿渗透压和比重
- C. 鉴定血浆和尿渗透压
- D. 加压素试验
- E. 禁饮试验

68. 维生素 K 缺乏时,不会出现的实验室检查结果是

- A. PT 延长
- B. APTT 延长
- C. CT 延长
- D. FDP 增加
- E. FNP 升高

69. M 受体阻断药的特点是

- A. 增加体内自主神经释放酶
- B. 对受体无亲和力,无内在活性
- C. 对受体无亲和力,有内在活性
- D. 对受体有亲和力,无内在活性
- E. 对受体有亲和力,有内在活性

70. 下列措施中,对防止结核性胸膜炎患者发生胸膜肥厚最重要的是

- A. 口服糖皮质激素
- B. 胸腔内注射糖皮质激素
- C. 胸腔内注射抗结核药物
- D. 胸腔内注射尿激酶
- E. 反复胸腔穿刺抽取胸腔积液

### A2 型选择题(71—132 题)

#### 答题说明

每一道考题下面是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

71. 女,24 岁。足月妊娠,临产 10 小时,宫口扩张 2cm,自觉下腹部持续疼痛,孕妇烦躁不安,疼痛喊叫,宫缩频率高,子宫下段收缩最强。患者初步诊断是

- A. 不协调性宫缩乏力
- B. 协调性宫缩乏力
- C. 骨盆狭窄
- D. 胎位不正
- E. 正常分娩

72. 男,83 岁。劳累时胸痛,慢性阻塞性肺疾病 30 年,慢性肾脏疾病 20 年。查体:R 25 次/分,BP 100/70mmHg,双肺呼吸音减弱,可闻及湿啰音、哮鸣音,心率 90 次/分,律齐,主动脉听诊区可闻及收缩期粗糙杂音,心脏超声显示 LVEF 45%,主动脉瓣重度狭窄,冠状动脉造影显示右冠远端 50% 狭窄。下列治疗正确的是

- A. 开胸主动脉瓣成形术
- B. 冠状动脉搭桥术
- C. 冠状动脉支架
- D. 抗心衰治疗
- E. 经皮主动脉瓣术

73. 调查发现某高原地区居民结肠癌的发病率高于全国平均水平,研究者注意到该地区人们的饮食习惯具有高脂肪摄入,低蔬菜、水果摄入的特点,拟

开展一项课题研究,分析饮食习惯与结肠癌的关系,考虑到因果现象发生的时间顺序。最佳研究方法应为

- A. 生态学研究
- B. 横断面研究
- C. 队列研究
- D. 病例对照研究
- E. 临床试验

74. 男,35 岁。高热、皮肤瘙痒 15 天,右颈及锁骨上淋巴结肿大,无压痛,互相黏连,Hb 90g/L,WBC  $10 \times 10^9/L$ ,N 66%,L 24%,骨髓涂片找到里-斯细胞。最大可能诊断是

- A. 结核性淋巴结炎
- B. 慢性淋巴细胞白血病
- C. 癌转移
- D. 淋巴瘤
- E. 风湿性疾病

75. 男,44 岁。头晕乏力、面色苍白 3 年。巩膜轻度黄染,脾肋下 2cm。Hb 56g/L,RBC  $1.8 \times 10^{12}/L$ ,WBC  $2.2 \times 10^9/L$ ,Plt  $32 \times 10^9/L$ 。骨髓增生减低,但红系增生,以中晚幼红为主,尿 Rous 试验(+),Ham 试验(+)。首先考虑

- A. 缺铁性贫血
- B. 巨幼细胞性贫血

- C. 再生障碍性贫血  
D. 阵发性睡眠性血红蛋白尿  
E. 自身免疫性溶血性贫血
76. 女, 20 岁。头晕、心悸、乏力 3 个月。查体: 贫血貌, 浅表淋巴结未触及肿大, 巩膜轻度黄染, 心肺未见异常, 腹平软, 肝肋下 1cm, 脾肋下 3cm。实验室检查: Hb 75g/L, RBC  $2.5 \times 10^{12}/L$ , WBC  $8.2 \times 10^9/L$ , Plt  $151 \times 10^9/L$ , 网织红细胞 0.12, Coombs 试验(+)。患者最可能的诊断是
- A. 自身免疫性溶血性贫血  
B. 巨幼细胞性贫血  
C. Evans 综合征  
D. 地中海贫血  
E. 缺铁性贫血
77. 女, 63 岁。车祸伤 12 天, 术中输新鲜血 5 单位。突然腹痛、发热 1 天。查体: T 38.7°C, 巩膜黄染, 全身散在充血性皮疹, 部分伴脱屑, 无明显痒感, 心肺未见异常, 腹软, 脐周轻压痛, 肝肋下 3 厘米, 脾肋下 1.5cm。血常规: Hb 83g/L, WBC  $2.7 \times 10^9/L$ , Plt  $76 \times 10^9/L$ , ALT 156U/L, AST 231U/L, TBiL  $67 \mu\text{mol/L}$ , DBiL  $24 \mu\text{mol/L}$ 。最可能的诊断是
- A. 慢性溶血  
B. 细菌性感染  
C. 循环超负荷  
D. 过敏反应  
E. 急性溶血
78. 女, 25 岁。右乳房肿块 3 月余, 右乳外上象限触及 3cm 结节, 无压痛, 淋巴结无肿大。超声检查示低回声结节边界清楚内部有钙化灶。该患者的诊断是
- A. 乳房肉瘤  
B. 乳管内乳头状瘤  
C. 乳腺囊性增生  
D. 乳腺癌  
E. 乳房纤维腺瘤
79. 女, 30 岁。不慎摔伤左脚踝部, 疼痛、肿胀。查体: 踝部压痛, 无反常运动。下列处理不正确的是
- A. 立即按摩  
B. 冰敷  
C. 固定踝部  
D. 患肢抬高  
E. 夹板固定
80. 男, 45 岁。右下腹隐痛 4 个月, 近 2 个月来乏力、消瘦, 常有低热。查体: 结膜苍白, 右侧腹部 5cm × 3cm 肿块。化验: Hb 95g/L。若检查诊断为升结肠癌, 最佳手术方式是
- A. 升结肠切除术  
B. 右半结肠切除术  
C. 全结肠切除术  
D. 升结肠及部分横结肠切除术  
E. 升结肠及末段回肠切除术
81. 女, 68 岁。右侧肢体动作迟缓伴震颤 7 个月。查体: 右侧肢体静止性震颤, 肌张力齿轮样增高。病变可能的部位是
- A. 大脑皮质  
B. 黑质  
C. 小脑  
D. 内囊  
E. 脑桥
82. 男, 62 岁。近 1 年来劳累时胸痛, 休息或含服硝酸甘油后数分钟即可缓解。既往高血压病史 10 余年, 药物控制满意。实验室检查: 血 LDL-C  $2.16 \text{mmol/L}$ 。改善患者预后的药物不包括
- A. 硝酸异山梨酯  
B. 辛伐他汀  
C. 福辛普利  
D. 美托洛尔  
E. 阿司匹林
83. 男, 40 岁。腰部扭伤后疼痛伴右下肢麻木 1 周, 咳嗽时加剧。查体: L<sub>4</sub> ~ L<sub>5</sub> 棘突间压痛, 右侧直腿抬高试验 30°(+), 右小腿外侧感觉迟钝, 母趾背伸 5 级, 腱反射正常。首选治疗是
- A. 微创手术  
B. 开放手术  
C. 封闭针  
D. 加强腰肌锻炼  
E. 严格卧床休息, 非甾体抗炎药物治疗
84. 男, 55 岁。间歇性跛行伴右小腿腓肠肌疼痛 1 年余。查体: 右小腿以下皮肤粗糙, 萎缩, 变薄发亮, 右足背动脉搏动消失。为明确治疗方案, 最有意义的检查是
- A. 多普勒超声  
B. 阶段性电抗阻和光电容积描述  
C. MRI 血管成像  
D. 动脉造影  
E. 阶段性动脉压测定
85. 男, 63 岁。排便时突发剧烈胸痛, 入院急查心电图示前壁、下壁心肌梗死, 脉搏 40 次/分, 2 小时后复



- 查心电图, P波规律, QRS波群正常, 心房率 120 次/分, 心室率 40 次/分。该患者心电传导系统中发生异常的位置为
- A. 窦房结  
B. 结间束  
C. 房室结  
D. 左束支  
E. 浦肯野纤维网
86. 女, 48 岁。2 天前餐后突然出现右上腹阵发性绞痛, 恶心, 尿色呈浓茶样, 以往有类似发作。查体: 急性病容, 巩膜黄染, 腹部无肌紧张, 右上腹深压痛。可能的诊断是
- A. 胆总管结石  
B. 胆道蛔虫病  
C. 胆总管囊肿  
D. 急性胰腺炎  
E. 急性胆囊炎
87. 男, 55 岁。有饮酒史 20 年, 每天半斤白酒, 2 年来间断上腹痛, 腹胀乏力, 大便不成形, 双下肢水肿。B 超示肝脏回声不均匀增强, 脾大, 少量腹水。该患者可能的诊断为
- A. 慢性胰腺炎  
B. 胰腺癌  
C. 酒精性肝硬化  
D. 胆囊癌  
E. 胃癌
88. 男, 60 岁。左上肢摔伤, 急诊来院。X 线示肱骨干横骨折, 并有移位, 经手法复位不理想, 后改为牵引治疗, 又经 X 线示骨折端有分离。其最可能的后果是
- A. 桡神经损伤  
B. 肩关节强直  
C. 肘关节僵直  
D. 损伤性骨化  
E. 骨折不愈合
89. 男, 32 岁。多次于饮酒后关节红肿疼痛发作, 累及的关节包括第一跖趾关节、踝或膝关节。该患者最可能出现的结果是
- A. 血 HLA-B<sub>27</sub>(+)  
B. 血尿酸水平升高  
C. X 线示骰骨关节炎  
D. 尿渗透压降低  
E. 关节腔穿刺液呈脓性
90. 女, 75 岁。摔倒时右手撑地, 腕部疼痛、肿胀。查体: 右腕部呈枪刺刀畸形。最可能的诊断是
- A. Galeazzi 骨折  
B. Colles 骨折  
C. Monteggia 骨折  
D. Chance 骨折  
E. Smith 骨折
91. 女, 28 岁。初产妇。双胎妊娠, 妊娠 39 周临产。查体: P 90 次/分, BP 140/80mmHg。规律宫缩 10 小时后宫口开全, 第一胎头位娩出, 新生儿体重 2 600g。第二胎儿为单臀先露, 已衔接, 胎心正常。本例恰当的处理措施是
- A. 行外转胎位术  
B. 产钳牵引术  
C. 行内转胎位术  
D. 等待臀位助娩术  
E. 立即剖宫产术
92. 女, 35 岁。G<sub>6</sub>P<sub>1</sub>。月经量增多 3 年, 经期及周期正常。妇科检查: 子宫前位, 饱满, 活动差, 无压痛。推荐该患者最佳的避孕方法是
- A. 惰性宫内节育器  
B. 避孕套  
C. 体外排精  
D. 紧急避孕药  
E. 短效口服避孕药
93. 男, 68 岁。排便时诉胸闷, 随即跌倒, 呼之不应, 皮肤发绀。最有助于确诊心脏骤停的临床表现是
- A. 意识丧失  
B. 呼吸停止  
C. 皮肤发绀  
D. 心音消失  
E. 桡动脉搏动消失
94. 女, 20 岁。2 年来月经期间发作性双颞剧烈头痛, 发作后, 常有疲劳, 倦怠, 无力, 食欲差, 家族“头痛”史。为防再发, 应选择的药物是
- A. 苯妥英钠  
B. 卡马西平  
C. 丙戊酸钠  
D. 苯巴比妥  
E. 托吡酯
95. 男, 40 岁。间断上腹痛 3 年, 加重 1 周, 1 周前上腹胀痛明显, 进食后加重, 伴恶心、呕吐, 呕吐物量多, 有酸臭味, 呕吐后症状有所缓解, 排便排气较



前减少。最可能的体征

- A. 腹肌紧张
- B. 液波震颤阳性
- C. 肠型
- D. 振水音阳性
- E. 肠鸣音减弱

96. 女, 48 岁。右乳房包块 6 个月。乳房无不适, 有时感左肩背部隐痛。查体: 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。右乳房外上象限可触及 3cm × 2cm 包块, 质硬, 不光滑, 活动, 无压痛, 左腋窝触及 3 枚肿大淋巴结。乳腺钼靶摄片示右乳房 2.5cm × 2.0cm 高密度影, 周边有毛刺, 中央有细沙样钙化点。拟行手术治疗, 预防术后感染最重要的措施是

- A. 安置有效的术后引流
- B. 术前、术中、术后应用广谱抗生素
- C. 遵守无菌操作
- D. 缝合前彻底冲洗
- E. 术前纠正贫血和低蛋白血症

97. 男, 24 岁。腹胀、便秘、乏力 5 个月。低热, 右下腹疼痛, 体重减轻。查体: T 37.8℃, P 92 次/分, R 18 次/分, BP 110/76mmhg, 双肺未闻及干湿啰音, 心律齐, 未闻及病理性杂音, 右腹可触及 5cm × 3cm 大小包块, 质中等, 边界不清, 轻触痛。下列最适宜的检查是

- A. 下腹部钡剂造影
- B. 结肠镜
- C. 腹部 CT 检查
- D. 粪常规及病原学检查
- E. γ-细胞毒释放检查

98. 男, 58 岁。突感头、颈项剧烈疼痛, 伴有大汗、恶心呕吐 1 小时。查体: 急性病容, 四肢活动自如, 脑膜刺激征阳性。此时的诊断为

- A. 脑栓塞
- B. 脑血栓形成
- C. 高血压脑病
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 脑干出血

99. 女, 21 岁。心情压抑, 烦闷, 兴趣下降 3 年, 3 年前高考发挥不好, 父母决定让其读二本, 自己觉得学校不理想, 抱怨都是父母让自己没有好的前途, 渐渐做事情没动力, 很少参加社团活动, 诉近 3 年来虽然能完成学业, 但一直感觉疲惫, 生活没有色

彩。最可能的诊断是

- A. 抑郁障碍
- B. 社交恐惧症
- C. 精神分裂症
- D. 恶劣心境
- E. 双向障碍

100. 男, 21 岁。突起四肢无力 1 周。查体: 四肢肌力 2 级, 肌张力低, 腱反射消失, 病理征未引出, 无明显感觉障碍, 双侧腓肠肌压痛。该患者最常见的病原体是

- A. CJ
- B. HPV
- C. EB 病毒
- D. HBV
- E. HIV

101. 女, 21 岁。右前臂骨干骨折。X 线示右前臂骨干下 1/3 骨折。易损伤的神经是

- A. 正中神经浅支
- B. 肌皮神经
- C. 桡神经
- D. 正中神经深支
- E. 尺神经

102. 男, 30 岁。近半年出现尿频、尿不净、尿道口滴白及肛周隐痛不适。多次检查尿常规: WBC 1 ~ 3/HP, 前列腺液常规: WBC > 10 个/HP, 卵磷脂小体 (+ + +) /HP。前列腺液培养阴性, 血常规无异常。该患者的诊断应为

- A. 慢性膀胱炎
- B. 泌尿系结核
- C. 非淋菌性尿道炎
- D. 慢性前列腺炎
- E. 膀胱结石

103. 女, 30 岁。发现颈部包块 2 年, 包块逐渐增大, 无甲亢表现, 目前有憋闷感。查体: 右侧甲状腺可触及 4cm × 3cm 包块, 光滑, 质韧, 随吞咽上下移动, 无压痛, 未触及肿大淋巴结。核素扫描: 甲状腺右叶温结节。建议手术治疗, 最主要的依据是

- A. 易发生继发感染
- B. 用力后包块易破裂
- C. 可继发甲亢
- D. 有压迫症状
- E. 易发生恶变

104. 男,65岁。排便次数增加6个月,伴里急后重,排便不尽感,1个月来,大便变细。偶有大便表面带血,自觉乏力,体重减轻4kg。决定该患者手术方式的要点是
- 是否合并肠周淋巴结转移
  - 病灶浸润肠壁的深度
  - 病灶下缘距齿状线的距离
  - 病灶浸润肠壁的周长
  - 病灶浸润肠壁的长度
105. 男,45岁。高空坠落5小时,伤后意识丧失5分钟,清醒后头痛,恶心2次,烦躁,左侧外耳道流出混血性液体。CT检查示新月形,少量积气。目前治疗不合适的是
- 填塞耳道
  - 暂不手术治疗
  - 避免用力咳嗽
  - 头高卧位休息
  - 预防性使用抗生素
106. 女,45岁。1天前感冒后出现发热,全身无力,厌食,腹泻,既往Sheehan综合征15年。口服泼尼松5mg/d治疗。查体:T 38.1℃,BP 82/40mmHg,神志淡漠,肺部听诊未见异常,心率92次/分,FBG(空腹血糖)3.3mmol/L。目前最有效的治疗是
- 静脉补液治疗
  - 静脉注射葡萄糖
  - 静脉注射升压药物
  - 静脉注射氢化可的松
  - 口服泼尼松增加剂量
107. 男婴,胎龄38周出生,宫内窘迫。出生Apgar评分1分钟3分,经抢救10分钟评分9分,6小时后出现抽搐。首选的药物是
- 苯妥英钠
  - 咪塞米
  - 地塞米松
  - 甘露醇
  - 苯巴比妥
108. 女,23岁。发热、腹痛1周,半月前流产并清宫。查体:T 38.8℃,下腹压痛反跳痛,宫口处有脓性分泌物,子宫大,压痛(+),双附件压痛,WBC及N升高。诊断为
- 异位妊娠破裂
  - 盆腔炎症性疾病
  - 溃疡性结肠炎
  - 不全流产
  - 急性阑尾炎
109. 女,1岁。生后2月口周发绀,今晨哭闹后发绀加重,意识丧失四肢颤动,持续1分钟缓解,胸骨左缘第2~4肋间3/6收缩期杂音,双下肢无水肿,神经系统正常。胸部X线示心尖上翘,肺动脉凹陷。意识丧失的原因为
- 法洛四联症并肺脓肿
  - 法洛四联症并缺氧
  - 法洛四联症并肺水肿
  - 法洛四联症并心衰
  - 法洛四联症并急性肺炎
110. 女,35岁。妊娠12周,2年前曾因“无脑儿”行引产术。其妊娠期进行产前诊断的方式不包括
- 染色体核型分析
  - 基因检测
  - 胚胎植入前诊断
  - 影像学检查胎儿结构
  - 基因产物检测
111. 男婴,7个月。4天前出现发热,体温最高达38.2℃,伴流涕咳嗽,1天前出现热峰达39.5℃,咳嗽加剧,耳后及面部逐渐出现皮疹。查体:神志清楚,精神欠佳,耳后及颜面部散在红色充血性斑丘疹,睑结膜充血,峡黏膜可见较多灰白色小点,外有红晕,咽部充血,呼吸急促,双肺呼吸音粗可闻及细湿啰音。该患儿至少隔离
- 出疹后10天
  - 出疹后14天
  - 出疹后5天
  - 所有皮疹结痂
  - 出疹后7天
112. 女,40岁。接触性阴道流血2个月。妇科检查:宫颈呈糜烂样改变,病理活检可见异型细胞局限宫颈上皮的下1/3,黏膜下炎细胞浸润。最可能的诊断为
- 微小浸润癌
  - 宫颈低鳞状细胞癌
  - 宫颈高鳞状细胞癌
  - 慢性宫颈炎伴鳞状上皮化生
  - 慢性弥漫性宫颈炎
113. 男,28岁。建筑工人。下午3时露天工作时出现大汗、头痛、胸闷、心悸,并有腹肌疼痛。当天最高气温

38℃,既往体健。查体:T 38.1℃,P 106 次/分, BP 90/60mmHg。神志清楚,面色潮红,双肺未闻及干湿啰音,心律齐。最可能的诊断为

- A. 低血糖
- B. 热射病
- C. 热痉挛
- D. 热衰竭
- E. 脱水

114. 女,58 岁。因呼吸困难、胸痛就诊。查体: BP 120/90mmHg,胸骨右缘第 2 肋间闻及收缩期喷射样杂音。病理特点为

- A. 主动脉瓣缩窄及黏连
- B. 主动脉瓣增厚及卷曲
- C. 三尖瓣增厚及卷曲
- D. 肺动脉瓣缩窄及黏连
- E. 肺动脉瓣增厚及卷曲

115. 男,45 岁。全身不适,发热、纳差、恶心半个月,既往有毒品注射史。查体:全身多处淋巴结肿大,口腔上见白膜,WBC  $2.5 \times 10^9/L$ ,尿蛋白(+)。首先需要检查的是

- A. HIV 抗体
- B. 登革热病毒抗体
- C. 汉坦病毒
- D. 乙肝五项
- E. 埃博拉病毒

116. 女,24 岁。到国外读书。刚到国外半年时因语言不通,生活习惯不同等原因,感觉不适应。该反应的应激原为

- A. 社会性应激原
- B. 躯体性应激原
- C. 心理性应激原
- D. 文化性应激原
- E. 职业性应激原

117. 男,51 岁。烧伤半小时。查体:T 36.2℃, P 112 次/分,R 24 次/分, BP 85/60mmHg,神志清楚,痛苦面容,全身 I°烧伤达 50% 以上。该患者休克的主要原因为

- A. 继发性感染
- B. 过敏
- C. 心输出量减少
- D. 组织坏死
- E. 低血容量及疼痛

118. 男,17 岁。为高三考生。因考试紧张焦虑就诊。

医师张某为其家属朋友,该生家属请求张某为其治疗,医生应允。该医生违反的原则为

- A. 尊重
- B. 同情
- C. 回避
- D. 中立
- E. 不伤害

119. 男,55 岁。半小时前呕血,晕厥 1 次,发病前 1 小时曾经进食。既往有乙肝病史 10 年,巩膜黄染,肝掌,蜘蛛痣,心肺(-),肝肋下未触及,脾肋下 3cm,肠鸣音 10 次/分。肝脏穿刺活检特征性病理表现为

- A. 肝细胞异型增生
- B. 汇管区炎细胞浸润
- C. 肝细胞坏死
- D. 小胆管增生
- E. 假小叶形成

120. 男,14 岁。半年前因“上感”自服青霉素后症状消失,近 2 天发生少尿、双下肢水肿。实验室检查:血 Cr  $185 \mu\text{mol/L}$ ,尿蛋白(++),WBC 25 ~ 30/HP。该病的致病因素为

- A. 遗传因素
- B. 药物
- C. 病毒感染
- D. 链球菌感染
- E. 免疫因素

121. 男,55 岁。10 年前诊断为肝炎肝硬化,3 年前行门腔静脉分流术;2 天前出现睡眠倒错、计算能力下降。该患者不宜进食的食物种类是

- A. 淀粉类食物
- B. 低脂饮食
- C. 高维生素食物
- D. 高纤维素食物
- E. 高蛋白饮食

122. 女,30 岁。不婚主义者,想去医院接受人工授精,但是被拒绝了。涉及的医学伦理学问题是

- A. 保护后代原则
- B. 患者有利原则
- C. 保密原则
- D. 社会公益原则
- E. 知情同意原则

123. 男,46 岁。入院经检查为癌前病变,需行手术治疗。患者得知病情后,心慌、乏力、头晕,医师做

患者和患者家属的工作,征得患者及家属同意后,准备手术。准备手术前需进行术前签字,签字者应为下列

- A. 患者本人
- B. 患者妻子
- C. 患者已成年的子女
- D. 患者兄弟姐妹
- E. 患者父母

124. 男,77岁。进行性右手震颤、动作缓慢6年,翻身困难1年。查体:面具脸,右手静止性震颤,四肢肌张力增高,行走缓慢。有前列腺增生、轻度肾功能不全和房颤病史。对该患者最恰当的治疗药物是

- A. 安坦
- B. 复方左旋多巴
- C. 丙炔苯丙胺(司来吉兰)
- D. 金刚烷胺
- E. 溴隐亭

125. 女,47岁。从3米高处坠落致左胸外伤8小时。查体:T 36.5℃,P 95次/分,R 16次/分,BP 100/60mmHg,神清,气管居中,反常呼吸运动,左胸壁可触及多根多处肋骨断端,左肺呼吸音明显减弱。最佳治疗方案首选

- A. 胸腔闭式引流
- B. 胸腔穿刺排气排液
- C. 开胸探查+肋骨固定
- D. 胸壁加压包扎
- E. 镇静止痛,鼓励排痰

126. 男,17岁。发热伴乏力、纳差、眼黄、尿黄5天。实验室检查:ALT 860U/L,AST 620U/L,TBil 60 $\mu$ mol/L。经常在街边小摊进餐。曾注射乙肝疫苗。本患者所患疾病的病原属于

- A. 单股负链RNA病毒
- B. 双股RNA病毒
- C. 单股正链RNA病毒
- D. DNA病毒
- E. 小RNA病毒

127. 男,70岁。因脑出血1小时入院,病情危重。医生建议立即手术,并告知家属手术可能存在的风险,不手术则会有生命危险。家属因经济困难,示意医生只需作简单处置,放弃救治,听任其死亡,但拒绝对此签字。此时医生应选择的最佳决策是

- A. 一定要家属签字,否则让患者转院
- B. 听从家属决定,并在病历上如实记录家属意见
- C. 征求医院领导意见并与家属充分沟通,确定符合实际的救治手段
- D. 提请法院作出决策
- E. 不考虑家属意见,医生直接手术

128. 李某因要报考研究生,欲向单位请假复习,遂找到其中学同学、县医院的执业医师王某,请王某为其开具病假条。王某为李开出了“病毒性心肌炎,全休1个月”的诊断证明书。对于王某的行为,县卫生局可以给予

- A. 取消处方权
- B. 罚款
- C. 调离医师岗位
- D. 行政处分
- E. 责令暂停执业6~12个月

129. 男,55岁。早期肝癌患者,微创术后,愈合良好,他认为局部癌组织已切除,不要再想着自己是癌症患者,应坦然地面对生活。该患者应对心理应激的方法是

- A. 提高自身应对能力
- B. 调整对事件认识
- C. 增加可控性和可预测性
- D. 接受心理治疗的帮助
- E. 采用心理防御机制

130. 某研究者在社区进行糖尿病患病率调查时,首先将全区的人群按经济条件分为好、较好、差三类,然后每一类各随机抽取1/100的人做调查。该研究者使用的抽样方法分别是

- A. 整群抽样,机械抽样
- B. 系统抽样,单纯随机抽样
- C. 机械抽样,分层抽样
- D. 分层抽样,单纯随机抽样
- E. 单纯随机抽样,系统抽样

131. 女,45岁。晨起左中指发僵疼痛,缓慢活动后可消失,屈伸中指时有弹响。最可能的诊断

- A. 类风湿性关节炎
- B. 狭窄性腱鞘炎
- C. 腱鞘囊肿
- D. 滑囊炎
- E. 创伤性关节炎

132. 女,13岁。月经初潮后1年,月经周期1~4个月,经量多伴血块,此次行经已8天,量仍多。主

要的止血措施是

- A. 大剂量雄激素
- B. 大剂量雌激素

- C. 小剂量孕激素
- D. 抗纤溶及促凝药物
- E. 诊断性刮宫术

A3/A4 型选择题(133—142 题)

答 题 说 明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道试题。请根据案例提供的信息,在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(133—134 题共用题干)

男,63 岁。4 年前开始出现记忆减退,近 1 年日益加重,不认识女儿,捡废旧物品,出门找不到家,不会穿衣,常呆坐、呆立、呆望,不言不语,对人冷淡,不关心家人。既往有冶游史。躯体神经系统检查无异常。精神检查:意识清,定向障碍,记忆障碍,个位数计算正确,两位数加法常错,夜间不眠,到处摸索,说身边有人唱歌,内容听不清,流露出悲观情绪,未见自杀行为,生活不能自理。化验:康华试验阴性,CSF 正常,CT:脑萎缩,额颞叶明显。

133. 最可能诊断是

- A. 老年性痴呆
- B. 脑血管性痴呆
- C. 脑肿瘤
- D. 麻痹性痴呆
- E. 正常压力脑积水所致痴呆

134. 该患者治疗效果预后如何

- A. 无有效治疗,预后不良
- B. 手术治疗预后较好
- C. 抗梅毒治疗,预后较好
- D. 治疗脑血管病后尚可
- E. 脑脊液分流手术,预后尚可

(135—136 题共用题干)

男,渔民。发热 1~2 天,最高 38.8℃,伴腹痛、腹泻,3~5 次/天,WBC  $11 \times 10^9/L$ ,N 0.52,L 0.13。

135. 首选检查为

- A. 粪常规
- B. 肝肾功能
- C. 腹部 B 超
- D. 血培养
- E. 环卵沉淀试验

136. 周尿培养正常。下一步检查应为

- A. 血培养

B. 尿培养

C. 大便培养

D. 大便涂片

E. 钩体血清学检查

(137—139 题共用题干)

女,35 岁。某大学教师。3 个月前因出国问题与领导争吵,而后逐渐表现出情绪低落,兴趣减退,对未来自来悲观失望,认为领导和同事都疏远她,常有怨天尤人的表现。能主动求医,接触良好。

137. 针对此例,在心理评估上宜采用

- A. 调查法
- B. 观察法
- C. 会谈法
- D. 作品分析法
- E. 心理测验法

138. 其主要的情绪反应是

- A. 焦虑
- B. 恐惧
- C. 愤怒
- D. 抑郁
- E. 痛苦

139. 初次接触首选的手段是

- A. 宣泄
- B. 领悟
- C. 强化控制
- D. 增强自信心
- E. 以上都不是

(140—142 题共用题干)

女,23 岁。妊娠 32 周。腹部撞击后,持续性腹痛,少量出血,既往产检健康。查体:P 100 次/分,R 22 次/分,BP 90/60mmHg,痛苦表情,宫底位于剑突下 3 横指,子宫轮廓清楚,胎心率 102 次/分,宫口未开。

140. 可能的诊断是

- A. 前置胎盘
- B. 胎盘早剥
- C. 早产临产
- D. 巨大胎儿
- E. 子宫破裂

141. 确诊首选检查是

- A. 缩宫素试验
- B. 胎心电子监护

C. B 超

D. MRI

E. 腹部穿刺

142. 此时不易发生的并发症是

A. 急性肾衰竭

B. DIC

C. 产后出血

D. 胎盘残留

E. 胎儿宫内死亡

### B1 型选择题 (143—150 题)

#### 答 题 说 明

以下提供若干组试题, 每组试题共用在试题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(143—144 题共用备选答案)

- A. 心力衰竭
- B. 肾性贫血
- C. 高血压脑病
- D. 肾静脉血栓
- E. 肾周脓肿

143. 急性肾盂肾炎可能出现的并发症是

144. 肾病综合征易出现的并发症是

(145—145 题共用备选答案)

- A. 呼吸浅慢
- B. 呼吸浅快
- C. 呼吸深慢
- D. 呼吸不规则
- E. 呼吸深快

145. 急性脑血管昏迷患者呼吸最常见的呼吸特点是

146. 成人急性呼吸综合征最常见的呼吸特点是

(147—148 题共用备选答案)

- A. 直接扩散

B. 上行性感染

C. 透壁性感染

D. 血行播散

E. 淋巴感染

147. 肝硬化自发性细菌性腹膜炎的常见感染途径是

148. 女性淋菌性腹膜炎的常见感染途径是

(149—150 题共用备选答案)

- A. 库肯勃瘤
- B. 卵泡膜细胞瘤
- C. 纤维瘤
- D. 颗粒细胞瘤
- E. 畸胎瘤

149. 卵巢肿瘤患者盆腔 X 线示牙齿及骨骼提示的肿瘤是

150. 镜下可见瘤细胞短梭形, 细胞交错排列呈漩涡状的肿瘤是

## 第二单元

### A1 型选择题 (1—75 题)

#### 答 题 说 明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 健康管理的首要一般步骤为  
A. 预防危害健康风险  
B. 收集健康信息  
C. 制定完善的健康计划  
D. 疾病危险度评估  
E. 健康维护计划的实施
- 鸟氨酸中间产物的氨基酸是  
A. 丙氨酸  
B. 组氨酸  
C. 谷氨酸  
D. 精氨酸  
E. 甲硫氨酸
- 急性缺氧引起的血管效应是  
A. 冠脉收缩、脑血管收缩、肺血管扩张  
B. 冠脉扩张、脑血管收缩、肺血管扩张  
C. 冠脉扩张、脑血管扩张、肺血管扩张  
D. 冠脉扩张、脑血管扩张、肺血管收缩  
E. 冠脉收缩、脑血管扩张、肺血管收缩
- 职业中毒诊断中十分重要的诊断为  
A. 社会调查  
B. 体格检查  
C. 临床症状  
D. 职业史  
E. 现场调查
- 不属于涉及人的生物医学研究的伦理原则的是  
A. 医学目的  
B. 伦理审查  
C. 知情同意  
D. 有偿服务  
E. 维护受试者利益
- 可导致人体内生物转化能力下降的主要因素为  
A. 高脂肪饮食  
B. 轻度肥胖  
C. 高糖饮食  
D. 肝功能下降  
E. 心肌缺血
- 以滑膜炎为基本病理改变的风湿病是  
A. 强直性脊柱炎  
B. 类风湿性关节炎  
C. 风湿性关节炎  
D. 骨性关节炎  
E. 痛风性关节炎
- 促红细胞生成素 (EPO) 的产生部位主要是  
A. 肝  
B. 肾  
C. 脾  
D. 骨髓  
E. 血液
- 恶性程度最高的甲状腺癌是  
A. 乳头状癌  
B. 滤泡癌  
C. 髓样癌  
D. 未分化癌  
E. 导管癌
- 在骨髓涂片细胞学检查的内容中,错误的是  
A. 分数 200 个或 500 个有核细胞  
B. 分数不同系列和不同发育阶段细胞  
C. 计数粒红比例  
D. 退化或破碎细胞在分数时应计入  
E. 巨核细胞单独计数
- 安乐死的伦理意义为  
A. 是医学人道主义的重要发展  
D. 生命质量论  
C. 生命价值论  
D. 人类控制死亡的重要手段  
E. 患者有尊严、有质量地度过临终阶段
- 关于子宫破裂的描述,正确的是  
A. 先兆子宫破裂应引导分娩  
B. 子宫破裂伴胎儿死亡应经阴道引产  
C. 有病理缩复环应考虑为子宫破裂  
D. 有古典式剖宫产史的子宫不易破裂  
E. 有血尿即可诊断为子宫破裂



13. 高危滋养细胞肿瘤患者首选的化学方案是
- PVB
  - TP
  - BEP
  - EMA - CO
  - EP - EMA
14. 院内感染的主要途径是
- 医疗器械
  - 医护人员直接传播
  - 呼吸道传播
  - 交叉感染
  - 内源性感染
15. 脂肪变性最常见的器官是
- 肝
  - 脑
  - 肺
  - 肾
  - 脾
16. 不存在于人体蛋白质分子中的氨基酸是
- 鸟氨酸
  - 丙氨酸
  - 亮氨酸
  - 谷氨酸
  - 甘氨酸
17. 关于新生儿呼吸系统生理特点的描述, 正确的是
- 肺表面活性物质至孕 28 周时迅速增加
  - 肺表面活性物质是由肺泡 I 型上皮细胞产生
  - 湿肺是由于肺部感染炎性渗出造成
  - 足月儿生后第 1 小时呼吸频率可达 80 ~ 90 次/分, 伴呻吟、发绀
  - 早产儿呼吸不规则, 易出现呼吸暂停
18. 甲状腺癌最常见的病理类型是
- 滤泡状癌
  - 髓样癌
  - 未分化癌
  - 乳头状癌
  - 腺癌
19. 诊断慢性支气管炎的标准是咳嗽、咳痰伴喘息, 每年发作
- 持续 3 个月、连续 1 年以上
  - 持续 3 个月、连续 2 年以上
  - 持续 2 个月、连续 1 年以上
  - 持续 2 个月、连续 2 年以上
  - 持续 2 个月、连续 3 年以上
20. 乳腺癌患者, 发现同侧腋下及胸骨旁有淋巴结转移, 但一般情况尚可, 宜行
- 乳癌扩大根治术
  - 单纯乳房切除术
  - 乳癌根治术
  - 改良根治术
  - 放疗加化疗
21. 胰岛  $\alpha$  细胞分泌的激素是
- 胰高血糖素
  - 胰岛素
  - 促胃液素
  - 胰多肽
  - 生长抑素
22. 心包穿刺术的绝对禁忌证是
- 心脏压塞
  - 化脓性心包炎
  - 肿瘤性心包炎
  - 结核性心包炎
  - 主动脉夹层
23. 抗胸腺细胞球蛋白(ATG)治疗重型再生障碍性贫血的机制是
- 刺激造血干细胞增殖
  - 抑制 T 细胞, 使造血功能恢复
  - 稳定血管内皮细胞, 减少出血
  - 改善骨髓微环境
  - 提高体内 EPO 水平
24. 尿道损伤合并尿外渗及阴囊血肿时, 有效的治疗方法是
- 导尿
  - 经会阴尿道吻合 + 清除血肿及尿外渗
  - 清除会阴部血肿
  - 耻骨上膀胱造瘘
  - 经会阴尿道修补
25. 艾滋病患者不应承担的义务为
- 配合临床试验
  - 告知性伴侣
  - 告知经治医师
  - 接受疾控中心的流行病学调查
  - 采取必要防护措施
26. 我国对待新冠肺炎密切接触者采取的措施为
- 留验
  - 预防治疗
  - 疫苗
  - 消毒
  - 居家隔离

27. 对急性肾盂肾炎诊断有意义的尿常规检查是
- A. 上皮细胞管型
  - B. 白细胞管型
  - C. 颗粒管型
  - D. 红细胞管型
  - E. 脂肪管型
28. 下列选项中为慢性肺源性心脏病所不具备的是
- A. 慢性阻塞性肺疾病
  - B. 肺动脉高压
  - C. 肺动脉硬化
  - D. 右心室肥大
  - E. 肺动脉主干栓塞
29. 临床预防服务的对象是
- A. 遗传患者
  - B. 病房患者
  - C. 健康人
  - D. 传染患者
  - E. 慢性病患者
30. 急性梗阻性化脓性胆管炎典型临床表现“Reynolds 五联征”不包括
- A. 腹痛
  - B. 神经系统症状
  - C. 休克
  - D. 黄疸
  - E. 呕吐
31. 原发性下肢静脉曲张与营养障碍密切相关的并发症是
- A. 足靴区皮肤溃疡
  - B. 血栓性静脉炎
  - C. 下肢水肿
  - D. 皮下瘀血
  - E. 局部血管破裂出血
32. 小儿肾积水患者常见的梗阻部位是
- A. 肾盂
  - B. 肾盂 + 输尿管
  - C. 输尿管膀胱交接部梗阻
  - D. 输尿管
  - E. 尿道
33. 影响血红素合成的关键维生素是
- A. 维生素 A
  - B. 维生素 E
  - C. 维生素 C
  - D. 维生素 B<sub>6</sub>
  - E. 维生素 B<sub>12</sub>
34. 腹膜返折以上直肠癌早期淋巴转移的主要途径是
- A. 向直肠上动脉旁淋巴结转移
  - B. 向腹股沟淋巴结转移
  - C. 向髂内淋巴结转移
  - D. 向直肠下动脉旁淋巴结转移
  - E. 向侧方淋巴结转移
35. 以下哪项符合绝对禁食
- A. 急性胰腺炎
  - B. 急性糜烂出血性胃炎
  - C. 慢性透壁性溃疡
  - D. 持续潜血阳性
  - E. 肝性脑病昏迷
36. 胸部 X 线示心影呈梨形见于
- A. 肺动脉段膨出
  - B. 左心室、右心室增大
  - C. 右心室增大
  - D. 右房右室大
  - E. 主动脉弓膨出
37. 不会诱发肝性脑病的是
- A. 上消化道出血
  - B. 感染
  - C. 使用氨基糖苷类抗生素
  - D. 高蛋白饮食
  - E. 使用地西洋类药物
38. 踝关节最薄弱的韧带是
- A. 胫腓前韧带
  - B. 胫腓后韧带
  - C. 外侧副韧带
  - D. 内侧韧带
  - E. 足底长韧带
39. 轻度宫颈糜烂: 糜烂面积小于宫颈面积的
- A. 1/4
  - B. 2/4
  - C. 1/3
  - D. 2/3
  - E. 1/5
40. 关于三度房室传导阻滞的表述, 不正确的是
- A. 阻滞部位均位于希氏束以下的束支系统
  - B. 是由于房室传导系统某一部分有效不应期极度延长, 大于逸搏间期
  - C. 心电图表现为 PR 间期不固定, 心房率快于心室率
  - D. 如果逸搏心律的 QRS 波群增宽, 阻滞部位大多发生在希氏束以下的部位
  - E. 少数情况下可同时存在两个逸搏起搏点, 引起逸搏心律不匀齐

- 
41. 小指不能内收提示
- 正中神经损伤
  - 尺神经损伤
  - 肌皮神经损伤
  - 桡神经损伤
  - 腋神经损伤
42. 艾滋病的主要传播途径之一是
- 性接触传播
  - 呼吸道传播
  - 虫媒传播
  - 消化道传播
  - 眼结膜接触传播
43. 严重吸人性呼吸困难最主要的特点是
- 鼻翼扇动
  - 发绀明显
  - 哮鸣音
  - 呼吸加深加快
  - 三凹征
44. 下列关于 IgA 肾病的描述, 正确的是
- 以血尿为主要表现的继发性肾小球疾病
  - 确诊有赖于肾活检病理检查
  - 病理类型主要为系膜毛细血管性肾小球肾炎
  - 本病发生于青壮年, 临床表现单一
  - 预后佳, 不会发生肾衰竭
45. 医务人员在长期的医学道德实践中形成和表现出来的稳定心理状态是
- 医德评价
  - 医德教育
  - 医德品质
  - 医德辩护
  - 医德修养
46. 医疗机构根据《药品不良反应报告和监测管理办法》对已知新发生的不良反应的上报时限为
- 3 天
  - 5 天
  - 7 天
  - 10 天
  - 15 天
47. 流行性乙型脑炎的传播途径是
- 性接触传播
  - 眼结膜接触传播
  - 呼吸道传播
  - 虫媒传播
  - 消化道传播
48. 消化性溃疡最常见的并发症是
- 急性穿孔
  - 幽门梗阻
  - 癌变
  - 慢性穿孔
  - 出血
49. 肾结核的典型症状是
- 脓尿
  - 膀胱刺激症状
  - 终末血尿
  - 肾区疼痛和肿块
  - 全身中毒症状
50. 左心室流入道和流出道的分界标志是
- 左房室瓣(二尖瓣)后瓣
  - 左房室瓣(二尖瓣)前瓣
  - 主动脉瓣
  - 室上嵴
  - 肺动脉瓣
51. 胎盘早剥最常见的并发症是
- 弥散性血管内凝血(DIC)
  - 急性肾功能衰竭
  - 产后出血
  - 席汉综合征
  - 心衰
52. 急诊室事故处理结束后, 医生需要在多长时间内补充病历
- 12 小时
  - 4 小时
  - 2 小时
  - 3 小时
  - 6 小时
53. 根据《传染病防治法》规定, 需按照甲类传染病采取预防控制措施的乙类传染病是
- 疟疾
  - 肺炭疽
  - 登革热
  - 梅毒
  - 肺结核
54. 欲比较两种药物的效果是否有差别, 若疗效评定为“很有效, 较有效, 效果一般, 基本无效”, 宜采用的统计分析方法是
- 卡方检验
  - t 检验

- C. 方差分析  
D. 回归分析  
E. 秩和检验
55. 具有高等学校医学专业本科学历, 报考执业医师资格考试的, 需要在医疗预防保健机构中工作满一定年限, 该年限是
- A. 3 年  
B. 5 年  
C. 1 年  
D. 4 年  
E. 2 年
56. 医生在与慢性病患者的交往中, 医患关系中最理想的模式是
- A. 主动 - 被动型  
B. 指导 - 合作型  
C. 共同 - 参与型  
D. 主动 - 主动型  
E. 被动 - 被动型
57. 维生素 D 缺乏性佝偻病初期的临床表现是
- A. 神经、精神症状  
B. 全身肌肉松弛  
C. 腕踝畸形  
D. 出牙延迟  
E. 颅骨软化
58. 不符合肺心病胸部 X 线表现的是
- A. 心尖上翘  
B. 心脏向左下扩大、靴形  
C. 肺动脉段扩张  
D. 梨形心  
E. 右下肺动脉增宽
59. 心理医生医治好患者之后, 在记者联系医生后将该患者的个人信息和诊疗情况登报报道。该医生违背的原则为
- A. 社会公益  
B. 个人利益  
C. 保密原则  
D. 公平公正  
E. 工作严谨
60. 具有高等学校医学专业本科学历, 考到执业医师资格证不做医生后, 执业医师资格证保留年限为
- A. 3 年  
B. 5 年  
C. 1 年  
D. 4 年  
E. 2 年
61. 由于结核性胸膜炎的胸腔积液蛋白含量高, 容易引起胸膜黏连, 因此抽胸水的原则是
- A. 患者没有呼吸困难就不必抽胸腔内积液  
B. 不管有多少胸腔积液都必须抽出  
C. 每周抽 4 次  
D. 每周抽 1 次  
E. 原则上应尽早尽快抽尽胸腔内积液
62. 对于用胰岛素治疗的患者, 反映胰岛  $\beta$  细胞分泌功能的较好指标是
- A. 血糖  
B. 胰岛素  
C. 糖化血红蛋白  
D. C 肽  
E. 糖化血浆白蛋白
63. 下列选项中将肝脏分为大致相等的两半的解剖结构是
- A. 镰状韧带  
B. 右叶间裂  
C. 正中裂  
D. 冠状韧带  
E. 左右三角韧带连线
64. 中年妇女乳头鲜红色血性溢液应首先考虑为
- A. 乳管内乳头状瘤  
B. 乳腺囊性增生症  
C. 乳腺导管扩张症  
D. 乳腺纤维腺瘤  
E. 乳腺癌
65. 可判断有机磷杀虫药中毒的严重程度并指导治疗最有意义的是
- A. 血胆碱酯酶活力  
B. 血氧分压  
C. 心率  
D. 瞳孔大小  
E. 肺部湿啰音
66. 能解除迷走神经活性且对血压影响不大的药物是
- A. 肾上腺素  
B. 阿托品  
C. 异丙肾上腺素  
D. 多巴胺  
E. 去甲肾上腺素
67. 与胰体的前面隔网膜囊相邻的解剖结构是
- A. 胃后壁  
B. 肝门胆管

- C. 肝右动脉  
D. 胆总管  
E. 腹主动脉
68. 下列关于腹股沟直疝临床表现的描述, 正确的是  
A. 极少发生嵌顿  
B. 按压深环肿块不再突出  
C. 疝囊颈位于腹壁下动脉外侧  
D. 透光试验阳性  
E. 容易进入阴囊
69. 肾盂癌患者有血尿, 双侧肾功能正常, 首选的治疗方法是  
A. 肾切除  
B. 肾盂肿瘤切除  
C. 化疗  
D. 患肾及输尿管全切除  
E. 继续观察
70. 在血浆蛋白电泳中, 泳动最慢的蛋白质是  
A. 清蛋白  
B.  $\alpha_1$ -球蛋白  
C.  $\alpha_2$ -球蛋白  
D.  $\beta$ -球蛋白  
E.  $\gamma$ -球蛋白
71. 高血压病脑出血破裂的血管多为  
A. 大脑中动脉  
B. 大脑基底动脉  
C. 豆纹动脉  
D. 内囊动脉  
E. 大脑前动脉
72. 心理测验工作应遵守的原则为  
A. 真诚、中立、回避  
B. 自强、自立、自省  
C. 信度、效度、常模  
D. 客观、保密、标准化  
E. 自主、学习、实效
73. 下列关于奥美拉唑的说法, 不正确的是  
A. 作用机制为抑制胃黏膜壁细胞  $H^+ - K^+ - ATP$  酶活性  
B. 作用机制为阻断胃黏膜壁细胞上胃泌素受体  
C. 治疗消化性溃疡病复发率低  
D. 临床用于治疗胃和十二指肠溃疡、反流性食管炎、卓-艾综合征  
E. 不良反应有头痛和胃肠道症状, 偶有皮疹、肝功能异常及男性乳房女性化
74. 中度失血性休克患者估计失血量为  
A. 500ml 以下  
B. 800ml 以下  
C. 800 ~ 1 000ml  
D. 800 ~ 1 600ml  
E. 1 000ml 以上
75. 医疗保险基金主要由雇主和雇员按一定比例缴纳, 政府适当补贴, 这种模式属于  
A. 国家医疗保险  
B. 储蓄医疗保险  
C. 商业医疗保险  
D. 补充医疗保险  
E. 社会医疗保险

## A2 型选择题 (76—135 题)

## 答 题 说 明

每一道考题下面是一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

76. 男, 28 岁。被摩托车撞伤右髌部, 经 X 线确诊为右股骨颈头下型骨折, 严重移位, 闭合复位未成功, 故行切开复位内固定术。发生哪种并发症的可能性最大  
A. 脂肪栓塞  
B. 坠积性肺炎  
C. 急性骨萎缩  
D. 关节强直  
E. 缺血性骨坏死
77. 男, 73 岁。头痛、精神异常, 左侧肢体无力 5 天, 加重偶伴呕吐 1 天, 3 个月前有头部外伤史。查体: BP 160/95mmHg, 神志清楚, 双侧视神经盘水肿, 左侧肢体肌力 4 级。该患者最可能的诊断是  
A. 脑内血肿  
B. 高血压脑出血  
C. 急性硬膜外血肿  
D. 急性硬膜下血肿  
E. 慢性硬膜下血肿

78. 女,42岁。10年前分娩后闭经。1周前因不洁饮食出现腹泻,食欲减退,精神萎靡,卧床不起,今天上午被家人发现神志不清来急诊。查体:BP 80/50mmHg,皮肤苍白,毛发稀疏,消瘦,心率90次/分,血糖2.4mmol/L,胸部X线示“左上肺陈旧性结核”。最可能的诊断是
- A. 多囊卵巢综合征  
B. 高胰岛素血症  
C. 卵巢早衰  
D. 子宫内腺异位症  
E. 腺垂体功能减退症垂体危象
79. 男,43岁。头部受伤后立即昏迷,20分钟后清醒,清醒后不能回忆受伤当时的情况,主诉头痛、头晕。检查:神经系统检查无阳性体征,脑脊液检查无红细胞,CT检查无异常发现。该患者最可能的诊断是
- A. 脑震荡  
B. 脑挫裂伤  
C. 硬膜下血肿  
D. 脑干损伤  
E. 硬膜外血肿
80. 男,33岁。因上腹痛10个月来诊。伴有胃胀、食量减少,嗝气,睡眠差。检查X线钡餐造影、胃镜未见异常。患者为程序工程师,最近频繁超时工作。考虑为
- A. 慢性浅表性胃炎  
B. 慢性萎缩性胃炎  
C. 功能性消化不良  
D. 胃溃疡  
E. 胃癌
81. 女,1个月。出生体重3500g,呕吐1周。生后3周左右开始溢乳,逐日加重呈喷射性呕吐,奶汁带凝块,不含胆汁。查体:体重3500g,皮肤轻度黄染,前囟稍凹,心肺无异常,上腹部蠕动波,右季肋下肿块,质较硬,光滑,移动。最可能的原因是
- A. 喂养不当  
B. 胃食管反流  
C. 幽门痉挛  
D. 先天性肥厚性幽门狭窄  
E. 胃扭转
82. 女,2个月。顽固性便秘和腹胀伴呕吐,营养不良。首先考虑为
- A. 先天性肥厚性幽门狭窄  
B. 先天性巨结肠  
C. 幽门痉挛  
D. 胃食管反流病  
E. 胃扭转
83. 男,50岁。皮肤黄染进行性加重35天,9天前发现小便呈浓茶样,近几天大便呈灰白色。查体:T 36.9℃,皮肤巩膜黄染,腹软,右上腹可触及肿大的胆囊,无压痛,无反跳痛。该患者手术治疗后第4天发生上腹剧烈疼痛,腹腔引流量明显增加,引流液淀粉酶15000U/L。患者最有可能发生的并发症是
- A. 胰瘘  
B. 急性胰腺炎  
C. 肠系膜血栓形成  
D. 肠痿  
E. 胆痿
84. 男,37岁。风湿性心脏瓣膜病主动脉瓣狭窄10年,进行性活动耐力减低,近1年来,每于剧烈运动中发生晕厥。无高血压、糖尿病、高脂血症病史。查体:BP 100/70mmHg。心率78次/分,律齐,主动脉瓣区可闻及收缩期喷射性杂音。超声心动提示左心室增大,LVEF 40%,主动脉瓣瓣口面积0.7cm<sup>2</sup>,平均压力阶差55mmHg,跨瓣峰速度5.4m/s。对该患者最恰当的处置是
- A. 每天口服单硝酸异山梨酯  
B. 晕厥时硝酸甘油急救  
C. 避免竞技性运动,其他体力活动不受限制  
D. 口服阿托伐他汀  
E. 主动脉瓣置换术
85. 女,74岁。行胃癌根治术后7天,咳嗽后腹正中伤口内有多量淡红色液体流出。最可能出现的情况是
- A. 切口脂肪液化  
B. 切口皮下积液  
C. 切口裂开  
D. 切口感染  
E. 切口内血肿
86. 男,22岁。双下肢进行性无力3天。现无法上楼,尿潴留。既往有冶游史,2周前感冒。查体:胸4平面以下深浅感觉消失,双下肢肌力2级,腱反射消失,Babinski征阳性。脑脊液细胞数0,蛋白100mg/L,糖和氯化物正常,RPR阴性。MRI示胸4~9脊髓略增粗,T<sub>2</sub>加权像见条索状高信号。最

可能的诊断是

- A. 脊髓髓内肿瘤  
B. 脊髓血管畸形  
C. 压迫性脊髓病(颈椎骨质增生)  
D. 急性脊髓炎  
E. 脊髓痨
87. 女,60岁。宫颈癌行子宫切除术后3天,晨起时突发左小腿疼痛,左足不能着地踏平,行走时疼痛加重。查体:左小腿肿胀,深压痛,足背动脉搏动存在。首选的检查为
- A. 同位素骨扫描  
B. 下肢CT  
C. 下肢X线平片  
D. 下肢MRI  
E. 下肢超声多普勒
88. 女,20岁。32小时前饱餐后参加剧烈运动时突发腹痛、腹胀。持续性,伴阵发性绞痛,并有频繁呕吐,无肛门排气。病情急剧加重并昏倒。查体:T 35.5℃,P 127次/分,BP 80/50mmHg,急性病容,四肢发绀。全腹肌紧张,有压痛和反跳痛,肠鸣音消失。腹穿抽出血性液体。该患者所患疾病最主要的病理生理改变是
- A. 细胞外液容量迅速减少  
B. 心输出量低,外周阻力高  
C. 左心室功能不全  
D. 短时大量出血  
E. 下腔静脉回流障碍
89. 女,43岁。腹痛16小时,呈持续性、阵发性加重,伴呕吐,无肛门排气。查体:全腹肌紧张,有压痛及反跳痛。行腹腔穿刺抽出的液体呈血性,伴臭味。最可能的诊断是
- A. 绞窄性肠梗阻  
B. 胃十二直肠穿孔  
C. 急性阑尾炎穿孔  
D. 结核性腹膜炎  
E. 急性重症胰腺炎
90. 男,28岁。突起寒战、高热、恶心呕吐、腰痛已5天。查体:重病容,眼睑浮肿,球结膜及胸部皮肤充血,腋下见少许点状出血点,BP 70/50mmHg,怀疑流行性出血热。本例必须首先考虑的治疗措施是
- A. 使用升压药  
B. 补充血容量  
C. 纠正酸中毒  
D. 选用抗病毒治疗  
E. 小剂量肝素抗DIC
91. 男,56岁。大量饮酒后剧烈呕吐,呕吐物先为胃内容物,后呕吐200ml鲜血。最可能的诊断为
- A. 急性糜烂出血性胃炎  
B. 应激性溃疡  
C. 食管贲门黏膜撕裂综合征  
D. 十二指肠合并出血  
E. 反流性食管炎合并出血
92. 男,40岁。在交往中保持独立而完整的人格,有自知之明,不卑不亢。属于心理健康标准中的哪一项
- A. 人格完整  
B. 适应环境  
C. 智力正常  
D. 情绪良好  
E. 人际和谐
93. 一所幼儿园内十几名儿童相继出现头晕、恶心、呕吐、腹痛等症状,同时有低血红蛋白表现。该幼儿园建在金属冶炼厂旁,中毒原因为
- A. 铅中毒  
B. 汞中毒  
C. 氟中毒  
D. 苯中毒  
E. 砷中毒
94. 女,35岁。全身无力2天,加重1天,不能正常发音,张口困难,呼吸困难等,几天后家人也中毒,症状相似。根据流行病学调查,相关患者均食用自家腌制的酱豆腐后产生中毒症状。则中毒的原因最可能是
- A. 神经酰胺酶毒素  
B. 痉挛毒素  
C. 耐热溶血素  
D. 肠毒素  
E. 肉毒素
95. 早产儿,34周出生,体重2100g。母亲胎膜早破,体温升高1小时剖宫产,生后评分5分,复苏后入住ICU,呼吸困难、青紫,逐渐加重,氧饱和度80%,PCO<sub>2</sub> 55mmHg,X线示双肺通透度降低,肺肝界、肺心界消失。诊断是
- A. 新生儿肺透明膜病  
B. 胎粪吸入综合征

- C. 新生儿湿肺  
D. 新生儿呼吸窘迫综合征  
E. 先天性膈疝
96. 某兵,需要去灾区救灾,恰巧母亲病重。其面临的动机冲突类型是  
A. 双趋冲突  
B. 双避冲突  
C. 趋避冲突  
D. 双重趋避冲突  
E. 双趋双避冲突
97. 男,32岁。聚餐后出现右上腹疼痛2天,向右肩胛区放射。查体:T 37.5℃,P 90次/分,R 19次/分,BP 130/80mmHg,双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音,心率90次/分,心律齐,右上腹肌紧张,压痛(+),Murphy征(+)。最可能的诊断是  
A. 急性胃炎  
B. 右肾结石  
C. 十二指肠球部溃疡  
D. 急性胰腺炎  
E. 急性胆囊炎
98. 女,40岁。离异后情绪低落、失眠。主治医师开二类精神处方进行治疗,处方依法保存的期限。该药品处方的保存时间至少是  
A. 1年  
B. 2年  
C. 3年  
D. 4年  
E. 5年
99. 初产妇,26岁。妊娠38周。骨盆外测量:骶耻外径19.5cm,髂棘间径25cm,髂嵴间径28cm,坐骨棘间径8cm,坐骨结节间径6.5cm。该孕妇的骨盆应诊断为  
A. 单纯扁平骨盆  
B. 佝偻病性扁平骨盆  
C. 均小骨盆  
D. 漏斗型骨盆  
E. 男型骨盆
100. 男,38岁。因胃癌行胃大部切除术,需要输血1200ml,经主治医生签字后,配血站不配血,说不符合程序。违反下列哪项程序  
A. 科主任未签字  
B. 医院领导未签字  
C. 库存中心领导未签字  
D. 医务科主任未签字  
E. 全部医师签字
101. 充血性心力衰竭加重期出现少尿,血BUN/Cr > 20,尿比重1.025。最可能的诊断是  
A. 肾后性急性肾衰竭  
B. 肾前性急性肾衰  
C. 急性肾小管坏死  
D. 急进性肾炎  
E. 急性间质性肾炎
102. 某研究者对随机抽取了300名大学生的身高和体重资料进行相关分析, $r=0.39$ ,且 $P < 0.01$  ( $\alpha = 0.05$ )。则说明身高和体重之间是  
A. 存在数量关系  
B. 存在因果关系  
C. 无直线相关关系  
D. 存在直线相关关系  
E. 无伴随关系
103. 男,38岁。反复肾绞痛3年,经常排出小结石,呈黄色,尿路X线检查未见显影。结石的性质最可能是  
A. 磷酸钙结石  
B. 草酸钙结石  
C. 尿酸结石  
D. 磷酸镁铵结石  
E. 混合结石
104. 男,25岁。低热、咳嗽、咽部不适2周。胸部X线示双肺下部网状及按小叶分布的斑片状浸润阴影。最可能感染的病原体是  
A. 流感嗜血杆菌  
B. 肺炎链球菌肺炎  
C. 肺炎克雷伯杆菌  
D. 铜绿假单胞菌肺炎  
E. 肺炎支原体
105. 为防止乙肝病毒携带者在入学时受到歧视,国务院废除了入学检测“乙肝五项”,明确规定禁止将携带乙肝病毒作为入学的限制条件。该举措体现的是传染病防治的什么医学伦理  
A. 公众利益为重  
B. 传染病患者的人权和尊严  
C. 遵循社会公平原则  
D. 进行传染病防治的宣传  
E. 进行检测与上报
106. 男,50岁。因突发持续胸痛8小时,喘憋2小时



入院。既往无高血压病史。查体:BP 150/70mmHg,端坐位,双肺可闻及少许细湿啰音,心界不大,心率 110 次/分,律齐, $P_2 > A_2$ 。心电图示:I、aVL、 $V_1 \sim V_6$ 导联 ST 段抬高 0.1~0.4mV,可见病理性 Q 波。该患者应慎用的药物治疗为

- A. 皮下注射吗啡
- B. 静脉注射毛花苷 C
- C. 口服阿司匹林
- D. 静脉注射硝酸甘油
- E. 静脉注射呋塞米

107. 女,30 岁。初产妇,未临产。妊娠 35 周,恶心、呕吐、乏力伴皮肤黄染、瘙痒 1 周。结合化验检查诊断为妊娠合并乙型病毒性肝炎(重型),除保肝治疗外。应采取的措施

- A. 尽快使用子宫动脉栓塞术
- B. 尽快行剖宫产术
- C. 尽快使用地西洋促进宫颈成熟
- D. 继续妊娠至 37 周
- E. 尽快使用利凡诺尔腔内引产

108. 女,59 岁。背部皮肤红肿 7 天,疼痛、恶寒。发热 1 天,糖尿病 10 年。查体:T 39℃,P 100 次/分,背部皮肤红肿,有多个脓点,范围 6cm × 5cm,Hb 120g/L,WBC  $18.6 \times 10^9/L$ ,Plt  $200 \times 10^9/L$ 。切开引流方法不正确的是

- A. 每天换敷料一次
- B. 清除脓点
- C. 做“+++”切口
- D. 切口边缘在病灶范围之内
- E. 切口深度到筋膜

109. 儿科护士发现医嘱有错,询问医生,医生呵斥护士不信任自己,并嘱其应遵循医嘱内容。该医生的行为违背了什么原则

- A. 相互平等,相互尊重
- B. 工作严谨
- C. 维护患者利益
- D. 相互信任、相互协作
- E. 相互学习,提高技能

110. 早产儿,胎龄 31 周。出生后 8 小时开始人工喂养,生后 2 周出现精神萎靡、纳差、腹胀、呕吐 2 次,大便略稀,粪隐血试验阳性。腹部 B 超声肠蠕动和肠壁血流减弱。腹部 X 线最具特征的表现是

- A. 肠壁间隙增厚

- B. 腹壁积液
- C. 选择性肠袢扩张
- D. 气腹
- E. 门静脉积气征

111. 男,13 岁。近 1 个月自觉体力进行性下降。查体:心前区未触及震颤,胸骨左缘第 2、3 肋间闻及 3/6 级收缩期喷射性杂音, $P_2$  增强,固定分裂。最可能的诊断

- A. 小型室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 中间型室间隔缺损
- E. 肺动脉瓣狭窄

112. 女,36 岁。妊娠 8 周。心悸气短 2 天,3 年前确诊为风湿性心脏病,二尖瓣狭窄。2 年前因心力衰竭住院治疗。对该孕妇的处理为

- A. 应用洋地黄
- B. 二尖瓣扩张术
- C. 负压吸引术
- D. 继续妊娠
- E. 药物流产

113. 女,11 个月。2 个月前因“睡眠不安,头部多汗,方颅”就诊,用维生素 D 及钙剂正规治疗 2 个月,症状好转。此时腕骨 X 线表现是

- A. 临时钙化带模糊
- B. 骨髓与干骺端距离加大
- C. 临时钙化带致密增厚
- D. 长骨短粗和弯曲,干骺端变宽呈杯口状
- E. 临时钙化带消失

114. 初产妇,25 岁。孕 39 周。规律宫缩 10 小时,宫口开全 2 小时,宫缩良好。阴道检查:LOT 位, $S^+3$ ,骨盆正常,胎心率 150 次/分。正确处理是

- A. 静脉滴注缩宫素
- B. 徒手旋转胎头后自然分娩
- C. 剖宫产
- D. 立即产钳助产
- E. 立即胎吸助产

115. 女,17 岁。阴道流血 16 天,量多,无性生活史,13 岁初潮,月经不规则。查体:下腹部压痛明显,Hb 54g/L。该患者治疗方式不包括

- A. 减少月经量
- B. 纠正贫血
- C. 调理月经周期

- D. 止血  
E. 诊断性刮宫
116. 男,64 岁。头晕、心悸 4~5 年,心尖搏动向左下移位,呈抬举性搏动,于胸骨左缘第 3、4 肋间闻及叹气样舒张期杂音,为递减型,向心尖传导,在心尖区闻及舒张早期隆隆样杂音,股动脉可闻及射枪音。首先应想到的诊断为
- A. 二尖瓣狭窄  
B. 主动脉瓣关闭不全  
C. 二尖瓣关闭不全  
D. 主动脉瓣狭窄  
E. 室间隔缺损
117. 男,35 岁。间断上腹痛 2 年。查体:无贫血貌,皮肤巩膜无黄染,心肺无异常,腹软,无压痛,肝脾无肿大,<sup>13</sup>C 尿素酶阳性。主要治疗药物不包括
- A. 阿米卡星  
B. 阿莫西林  
C. 克拉霉素  
D. 枸橼酸铋钾  
E. 奥美拉唑
118. 男,35 岁。发热 2 个月,咳嗽带血 3 天,2 年前患过胸膜炎,T 38℃,胸部 X 线示左肺尖密度阴影。ESR 30mm/h,WBC  $8.0 \times 10^9/L$ 。该患者的治疗为
- A. SM + INH + RAS  
B. 抗真菌药  
C. 口服阿奇霉素  
D. INH + RFP + EMB  
E. 抗生素
119. 男,49 岁。湖北农民,发热、头痛 1 天。查体:T 39℃,皮肤黄染,双下肢可见少许出血点,结膜充血,肝肋下 2cm,压痛阳性,脾肋下未触及,腓肠肌压痛明显。血常规:WBC  $15.0 \times 10^9/L$ ,N 0.88,Hb 100g/L,ALT 215U/L,AST 120U/L。所患疾病的传播途径是
- A. 疫水接触史  
B. 蚊虫叮咬  
C. 跳蚤叮咬  
D. 尾蚴叮咬  
E. 蜱虫叮咬
120. 女,50 岁。黄疸患者,B 超示肝内胆管直径约 1cm。应进一步选择的检查是
- A. 静脉胆道造影  
B. 核素扫描  
C. 经皮肝穿刺胆道造影  
D. 十二指肠低张造影  
E. 腹腔动脉造影
121. 青年刘某在筹备婚礼的过程中,连续多日劳累,患化脓性扁桃体炎。医生在诊查中发现其同时患有淋病。该患者住院 4 天,扁桃体炎痊愈出院,医生嘱其充分休息。按照《母婴保健法》的规定,刘某
- A. 不能结婚  
B. 应当暂缓结婚  
C. 可以结婚,但不能生育  
D. 可以结婚,治愈后可生育  
E. 不影响结婚生育
122. 一患者入院后对医生抱怨自己没钱买药,病情加重后才住院治疗,子女对自己关心不足,医护人员更加关心其他患者对自己关心不够,要求更换医生。对该患者的行为,医生的正确做法是
- A. 批评教育  
B. 理解尊重  
C. 耐心倾听  
D. 特殊照顾  
E. 转诊
123. 女,26 岁。1 型糖尿病。采用强化胰岛素治疗方案,夜间血糖控制良好,无低血糖发生,但清晨空腹血糖仍然较高。原因可能是
- A. 糖耐量减低  
B. 黎明现象  
C. Somogyi 现象  
D. 反应性高血糖  
E. 夜间胰岛素作用不足
124. 男,35 岁。因被倒塌的房屋压伤左下肢 6 小时入院。查体:T 37℃,P 108 次/分,R 28 次/分,左下肢大片肌肉撕脱,伤口处留有大量污物。急诊行清创处理。术后 3 天,患者体温逐步上升,烦躁不安,大量出汗,尿量明显减少,观察伤口,左下肢明显肿胀,见大量恶臭浆液血性渗出物,皮下可触及捻发音。下列处理措施不正确
- A. 整块切除受累肌肉  
B. 术后勤换敷料  
C. 应用高压氧治疗  
D. 首选氨基糖苷类抗生素  
E. 病变区多处切开

125. 女, 84 岁。慢性阻塞性肺疾病 30 年, 因突发意识障碍入院, 有高血压、心力衰竭等并发症, 医生全力抢救, 但患者无治愈希望, 医生与患者家属沟通后, 患者家属认为没有治愈的可能不如减轻患者痛苦, 给予临终关怀。临终关怀的最重要的目的是
- 延长患者生命时间
  - 提高临终患者生命质量
  - 促进患者死亡
  - 减轻患者经济负担
  - 节约医疗卫生资源
126. 李某, 局限性癌切除后, 已经处于恢复状态, 但仍要求住院观察。该角色行为属于
- 角色行为异常
  - 角色行为强化
  - 角色行为冲突
  - 角色行为缺如
  - 角色行为减退
127. 某糖尿病患者为了控制血糖, 在医生的建议下准备和营养师一起制定一份饮食计划。她虽然知道饮食控制的好处, 但总认为无法管住自己, 计划难以实施。对于这样的患者, 干预的重点是
- 提高自我效能
  - 培养行为能力
  - 提高结果预期
  - 提供社会支持
  - 建立支持性环境
128. 男, 28 岁。在田地劳动时, 右足被带锈铁钉刺伤, 伤口约 2cm, 自行包扎未就医。5 天后患者出现全身乏力, 头晕, 头痛, 并觉张口困难, 颈强直 (+), 头后仰, 角弓反张。对造成该疾病的致病菌特点的描述, 正确的是
- 细菌形态为球菌
  - 致病菌素主要为内毒素
  - 感染必须具有缺氧环境
  - 革兰染色阴性
  - 芽胞对热、干燥不耐受
129. 女, 72 岁。糖尿病病史 8 年, 瑞格列奈 2mg tid, 近期血糖控制不佳。既往高血压病史 10 年。冠心病病史 5 年。身高 158cm, 体重 50kg, BMI 20。实验室检查: 空腹血糖 12.5mmol/L, 餐后 2 小时血糖分别为: 7.8mmol/L、8.4mmol/L 和 8.8mmol/L; 夜间血糖: 10.5mmol/L, 糖化血红蛋白 9.2%。目前最适应的治疗是加用
- 噻唑烷二酮
  - 胰岛素
  - 双胍类
  - $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂
  - 磺脲类
130. 男, 70 岁。高血压病 20 年, 血压最高 180/80mmHg, 服用福辛普利血压控制在 150/60~160/60~70mmHg。为了有效控制血压, 最佳的联合用药方案是
- 利尿剂 +  $\beta$  受体阻滞剂
  - $\beta$  受体阻滞剂 + 钙通道阻滞剂
  - ACEI 抑制剂 + 钙通道阻滞剂
  - $\alpha$  受体阻滞剂 +  $\beta$  受体阻滞剂
  - 利尿剂 + 钙通道阻滞剂
131. 女, 54 岁。有甲亢的病史, 近日因过劳和精神受刺激, 而出现失眠, 心慌, 胸闷。体检: 心率 160 次/分, 心电图有明显的心肌缺血改变, 窦性心律不齐。此时最好选用
- 胺碘酮
  - 奎尼丁
  - 普鲁卡因胺
  - 普萘洛尔
  - 利多卡因
132. 女, 32 岁。农村居住, 甲亢 6 年, 疏于治疗, 长期不愈, 临床疑诊甲亢合并心脏病, 心功能 II 级。甲状腺 I° 肿大, 甲状腺  $^{131}\text{I}$  摄取率 3 小时 68%, 24 小时 90%。下列哪项治疗应首先考虑
- 甲硫咪唑治疗
  - 丙硫氧嘧啶治疗
  - 手术治疗
  - 甲硫咪唑 + 普萘洛尔治疗
  - $^{131}\text{I}$  治疗
133. 男, 76 岁。晨起突发头疼, 右半身麻木伴感觉缺失 1 小时, 既往高血压病史 12 年。查体: 右侧偏身感觉减退伴轻度自发疼痛, 四肢肌力正常。病变最可能累及的部位是
- 下丘脑
  - 上丘脑
  - 右侧丘脑
  - 后丘脑
  - 左侧丘脑
134. 女, 59 岁。在全身麻醉下行腹膜后肿瘤切除术, 术中出血较多, 即刻输注 AB 型悬浮红细胞 2 个

单位,当输注 50ml 时,患者出现发热,畏寒,脉快,血压下降,腰痛,导尿浓茶色。该患者最可能的输血不良反应是

- A. 急性溶血性反应
- B. 过敏反应
- C. 非溶血性发热反应
- D. 细菌污染性输血反应
- E. 慢性溶血

135. 男,52 岁。肥胖体质。近 5 个月来数次发作性右

上腹疼痛,恶心呕吐,多为夜间睡眠后发作,并向右肩部放射。查体:BP 110/90mmHg,P 90 次/分,右上腹轻度压痛,无腹肌紧张。病情进一步加重,并出现黄疸,应首先考虑

- A. 急性坏死性胰腺炎
- B. 胆囊穿孔性腹膜炎
- C. 亚急性肝坏死
- D. 胆囊癌侵犯肝总管
- E. 胆囊结石进入胆总管并堵塞远端

**A3/A4 型选择题(136—146 题)**

**答 题 说 明**

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道试题。请根据案例提供的信息,在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

**(136—137 题共用题干)**

女,55 岁。体检发现颈部包块 3 个月。查体:气管右侧可扪及一质硬结节,表面不光滑,随吞咽上下移动,同侧胸锁乳突肌前缘可扪及 2 个肿大淋巴结。放射性核素扫描为“冷结节”。

136. 该患者最可能的诊断是
- A. 单纯性甲状腺肿
  - B. 甲状腺炎
  - C. 结节性甲状腺肿
  - D. 甲亢
  - E. 甲状腺髓样癌

137. 为进一步明确诊断,最好的检查是

- A. 颈部增强 CT
- B. 甲状腺核素静态显像
- C. 颈部彩色多普勒超声
- D. 血清甲状腺素水平
- E. 细针穿刺细胞学检查

**(138—139 题共用题干)**

男,52 岁。初诊 2 型糖尿病 2 个月,每天进主食量约 500g,身高 171cm。体重 90kg,BMI 30.8。查空腹血糖 5.8mmol/L,餐后 2 小时血糖 12.8mmol/L,糖化血红蛋白 7.2%。

138. 目前治疗不宜选择降血糖的药物是

- A. 磺脲类
- B.  $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂
- C. 噻唑烷二酮类
- D. 双胍类

E. 格列奈类

139. 目前首选的治疗药物是

- A. 阿卡波糖
- B. 那格列奈
- C. 二甲双胍
- D. 格列本脲
- E. 吡格列酮

**(140—141 题共用题干)**

女,38 岁。餐后上腹疼痛 2 年。经服用西咪替丁可缓解,症状反复出现,至医院就诊。胃镜发现胃小弯侧溃疡性病变,病理证实良性。

140. 符合该患者的 X 线钡餐检查结果是

- A. 龛影
- B. 充盈缺损
- C. 小弯侧指状压迹
- D. 胃壁僵硬、蠕动减弱
- E. 胃黏膜纹理破坏、中断

141. 患者行胃大部切除术后第 6 天。胃管内流出咖啡色胃液 300ml,最可能是因为

- A. 吻合口感染
- B. 吻合口漏
- C. 术后正常出血
- D. 术中止血不确切
- E. 吻合口部分黏膜坏死脱落

**(142—143 题共用题干)**

女,44 岁。坐公交车回家途中,突然感到心前区发闷、呼吸困难、出汗,觉得自己就要不行了,不能自

控,要发疯,为此感到紧张害怕,立即被送到医院急诊。未经特殊处理,半小时后症状消失,体格检查正常。

142. 最可能的诊断

- A. 支气管哮喘
- B. 心绞痛
- C. 惊恐发作
- D. 分离(转换)性障碍
- E. 嗜铬细胞瘤

143. 该患者缓解症状首选的药物是

- A. 普萘洛尔
- B. 帕罗西汀
- C. 甲疏咪唑
- D. 劳拉西泮
- E. 阿立哌唑

(144—146 题共用题干)

女,16个月。发热4天,呕吐1次,抽搐1次。既往6个月曾热性惊厥1次。按时预防接种,出生史无特殊。查体:T 38.1℃,R 30次/分,BP 90/55mmHg。颈抵抗(+),双肺听诊未见异常。心率130次/分,律齐,腹软、肝脾肋下未触及,四肢暖,肌力、肌张力正

常,Babinski征(+)

144. 初步诊断首先考虑

- A. 中毒型细菌性痢疾
- B. 中枢神经系统感染
- C. 脑发育不全
- D. 热性惊厥
- E. 手足搐搦症

145. 为明确诊断首先宜进行的检查是

- A. 脑电图
- B. 血钙、磷测定
- C. 腰穿检查脑脊液
- D. 粪镜检及培养
- E. 血培养加药物敏感试验

146. 【假设信息】抗生素静脉滴注3天后热退精神好转。但1周后又发热至38.5℃左右,并呕吐惊厥1次。最可能出现的情况是

- A. 并发脑脓肿
- B. 并发硬膜下积液
- C. 并发脑积水
- D. 并发脑室管膜炎
- E. 院内上呼吸道感染

### B1 型选择题 (147—150 题)

#### 答 题 说 明

以下提供若干组试题,每组试题共用在试题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(147—148 题共用备选答案)

- A. P50
- B. P95
- C. P99
- D. P1
- E. P5

147. 某生理指标偏态分布,且过高异常,为制定99%医学参考值范围,可计算

148. 某生理指标偏态分布,且过低异常,为制定95%医学参考值范围,可计算

(149—150 题共用备选答案)

- A. 起付线

B. 封顶线

C. 自付线

D. 共同付费

E. 封底线

149. 医疗保险设置开始支付医疗费用的最低标准,低于该标准的医疗费用由患者支付,该标准被称为

150. 某患者因病住院20天,治疗共用53 000元,结算费用时被告知其中50 000元以下的部分有医保支付,另外3 000元需个人支付,该案例中的50 000是

## 第三单元

### A1 型选择题(1—72 题)

#### 答 题 说 明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 结核性腹膜炎最有诊断价值的检查是  
A. PPD 试验  
B. 结肠镜检查  
C. 血沉  
D. 腹水常规  
E. 腹腔镜检查 + 腹膜活检
2. 反流性食管炎治疗作用最强的药物是  
A. 法莫替丁  
B. 奥美拉唑  
C. 颠茄  
D. 铝碳酸镁  
E. 多潘立酮
3. 在多数情况下,继发性腹膜炎最主要的治疗方法是  
A. 静脉注射抗生素  
B. 胃肠减压  
C. 营养支持  
D. 手术治疗  
E. 腹腔灌洗
4. 肺炎链球菌肺炎治疗的首选抗生素为  
A. 红霉素  
B. 庆大霉素  
C. 氧氟沙星  
D. 青霉素 G  
E. 林可霉素
5. 下列关于可能引起类风湿性关节炎的感染因子中,通过活化 B 淋巴细胞而致病的感染因子是  
A. 支原体  
B. EB 病毒  
C. 大肠埃希菌  
D. 链球菌  
E. 柯萨奇病毒
6. 食管胸部前面邻接的结构是  
A. 半奇静脉  
B. 奇静脉  
C. 胸主动脉  
D. 胸导管  
E. 左心房
7. 儿童期出现的甲状腺结节恶性率为  
A. 10%  
B. 30%  
C. 50%  
D. 70%  
E. 80%
8. 中性粒细胞减少是指外周血白细胞总数低于  
A.  $0.5 \times 10^9/L$   
B.  $4.0 \times 10^9/L$   
C.  $1.5 \times 10^9/L$   
D.  $3.0 \times 10^9/L$   
E.  $0.2 \times 10^9/L$
9. 诊断甲亢(Graves 病)最有价值的体征是  
A. 皮肤湿润、多汗、手颤  
B. 阵发性心房纤颤  
C. 甲状腺肿大伴震颤和血管杂音  
D. 收缩压升高,舒张压降低,脉压增大  
E. 窦性心动过速
10. 早期慢性支气管炎肺部 X 线表现是  
A. 无特殊征象  
B. 双肺纹理增粗、紊乱  
C. 肺野透亮度增加  
D. 膈肌下降  
E. 胸部扩张、肋间增宽
11. 下列哪一项不是肝硬化腹水治疗必须遵循的原则  
A. 快速利尿消退腹水可促使病情缓解  
B. 留钾利尿剂和排钠利尿剂并用

- C. 服用呋塞米利尿时应补充氯化钾  
D. 腹水减退后,仍需限制钠的摄入  
E. 体重减轻不超过 0.5kg/d
12. 儿童生理性补液为  
A. 2:3:1 含钠液  
B. 4:3:2 含钠液  
C. 2:1 等张含钠液  
D. 1:2 含钠液  
E. 1:4 含钠液
13. 大叶性肺炎实变期不应出现的体征是  
A. 胸膜摩擦音  
B. 肺部叩诊浊音  
C. 气管向健侧移位  
D. 可听到湿啰音  
E. 可听到支气管呼吸音
14. 下列有关急性胰腺炎的各项检查中,最早出现异常的是  
A. 血清脂肪酶  
B. 血清正铁血白蛋白  
C. 血淀粉酶  
D. 尿淀粉酶  
E. 血清乳酸脱氢酶
15. 阑尾手术切口的标志点是  
A. 麦氏点  
B. 华氏点  
C. 墨氏点  
D. 雷氏点  
E. 左下腹点
16. 区别血红蛋白尿与血尿的主要方法是  
A. 尿比重  
B. 尿胆红素  
C. 尿蛋白电泳  
D. 尿沉渣镜检  
E. 尿蛋白定性试验
17. 拇指不能外展和对掌,手掌桡侧 3 个半,指感觉障碍,可能损伤的神经是  
A. 正中神经  
B. 尺神经  
C. 桡神经  
D. 肌皮神经  
E. 臂丛神经
18. 反应长期血糖控制的最佳指标是  
A. 空腹血糖  
B. 血压  
C. 糖化血红蛋白  
D. 尿糖  
E. 血清胰岛素水平
19. 瘢痕性幽门梗阻临床表现的叙述,错误的是  
A. 呕吐量大,一次可达 1 000 ~ 2 000ml  
B. 呕吐物多为宿食,有酸臭味,含有胆汁  
C. 上腹隆起,可有蠕动波  
D. 可有振水音  
E. 可有低钾低氯性碱中毒
20. 新生儿沙眼衣原体感染的主要途径是  
A. 呼吸道感染  
B. 宫内感染  
C. 乳汁感染  
D. 产道感染  
E. 唾液感染
21. 下列指标中用于鉴别原发性与继发性甲状腺功能减退症的是  
A. TSH  
B.  $TT_3$   
C.  $TT_4$   
D.  $FT_3$   
E.  $FT_4$
22. 胰腺癌首选的检查方法是  
A. B 超  
B. X 线气钡双重造影  
C. CT  
D. MRI  
E. 血、尿淀粉酶测定
23. 绞窄性肠梗阻的临床表现,哪项是错误的  
A. 持续剧痛无缓解  
B. 呕吐血性或棕褐色液体  
C. X 线示膨胀突出的孤立肠祥随时间改变位置  
D. 出现腹膜刺激征  
E. 肠鸣音消失
24. 阳性结果最有助于排除肺血栓栓塞的检查是  
A. 心电图  
B. 胸部 X 线  
C. 血 D-2 聚体  
D. 下肢深静脉彩超  
E. 动脉血气分析

25. 胫骨平台骨折,最容易引起的并发症是
- A. 骨筋膜室综合征
  - B. 缺血性骨坏死
  - C. 骨化性肌炎
  - D. 骨折不愈合
  - E. 创伤性关节炎
26. 符合继发性腹膜炎腹痛特点的是
- A. 阵发性全腹绞痛
  - B. 剧烈,持续性全腹痛
  - C. 逐渐加重的阵发性腹痛
  - D. 疼痛与进食有关
  - E. 高热后全腹痛
27. 控制中枢性尿崩症的药物首选是
- A. 氯磺丙脲
  - B. 垂体后叶素
  - C. 鞣酸加压素
  - D. 去氨加压素
  - E. 氢氯噻嗪
28. 不属于急性病毒性心肌炎常见临床表现的是
- A. 先有发热,然后出现心悸、胸闷
  - B. 恶心、呕吐等消化道症状
  - C. 可合并各种心律失常
  - D. 常出现器质性心脏杂音
  - E. 心动过速与发热程度不平行
29. 慢性肾衰竭尿中常见的管型是
- A. 白细胞管型
  - B. 红细胞管型
  - C. 透明管型
  - D. 颗粒管型
  - E. 蜡样管型
30. Killip 分级,心功能Ⅲ级指
- A. 未闻及肺部啰音和第三心音
  - B. 肺部有啰音,但啰音的范围 < 50%
  - C. 肺部有啰音,且啰音的范围  $\geq$  50%
  - D. 肺部可闻及散在的哮鸣音
  - E. 血压 < 70/40mmHg
31. 慢性肺心病肺功能代偿期的表现中,下述选项错误的是
- A. 干、湿啰音提示支气管内有感染
  - B. 肺动脉第二音亢进提示肺动脉高压
  - C. 三尖瓣区听到收缩期杂音提示右心肥厚
  - D. 剑突下出现收缩期搏动提示左心肥厚
  - E. 颈静脉充盈提示胸腔内压升高并非都有心衰
32. 淋病的特点,错误的是
- A. 易侵袭黏膜
  - B. 以性传播为主
  - C. 是世界上发病率最高的性传播疾病
  - D. 感染最早期表现为阴道炎
  - E. 病原体为革兰阴性双球菌
33. 当支气管哮喘与心源性哮喘一时难以鉴别时,可使用下列哪项药物以缓解症状
- A. 毛花苷 C
  - B. 肾上腺素
  - C. 氨茶碱
  - D. 吗啡
  - E. 呋塞米
34. 属于红细胞周围环境异常所致的溶血性贫血的是
- A. 遗传性球形细胞增多症
  - B. PNH
  - C. 自身免疫性溶血性贫血
  - D. 海洋性贫血
  - E. 血红蛋白病
35. 骨折的专有体征是
- A. 血运不良
  - B. 疼痛与压痛
  - C. 局部肿胀
  - D. 功能障碍
  - E. 畸形
36. 血液中各种成分的含量大多随贮存时间的延长而下降,只有下列哪一种例外
- A. 红细胞的生活力
  - B. 钾离子浓度
  - C. pH
  - D. 血小板的活性
  - E. 红细胞携带氧的能力
37. 体内氨的主要去路
- A. 生成铵盐
  - B. 合成尿素
  - C. 合成谷氨酰胺
  - D. 生成非必需氨基酸
  - E. 参与嘌呤、嘧啶合成
38. 心身疾病的诊断原则是
- A. 心理治疗
  - B. 发病前有明确的心理社会因素存在
  - C. 药物治疗
  - D. 采用躯体诊断即可
  - E. 心理社会因素可以和躯体症状之间没有明确的时间关系



39. 有关早期胃癌的叙述, 正确的是
- 直径  $< 1.0\text{cm}$  的胃癌为早期胃癌
  - 浸润仅限于黏膜层
  - 浸润超过黏膜下层
  - 病理类型以未分化癌为多见
  - 多呈息肉状
40. 第一类精神药品处方保存期限为
- 1 年
  - 2 年
  - 3 年
  - 4 年
  - 5 年
41. 病毒性心肌炎最常见的致病微生物是
- 草绿色链球菌
  - 金黄色葡萄球菌
  - EB 病毒
  - 巨细胞病毒
  - 柯萨奇 B 组病毒
42. 食管裂孔通过的结构是
- 主动脉
  - 下腔静脉
  - 食管
  - 胸导
  - 迷走神经
43. 一患者检查发现得了病不想活了, 可能出现的角色适应问题是
- 角色冲突
  - 角色缺如
  - 角色强化
  - 角色消退
  - 角色异常
44. 形成喉结的喉软骨是
- 甲状软骨
  - 环状软骨
  - 会厌软骨
  - 杓状软骨
  - 气管软骨
45. 与脊柱结核有关的体格检查方法是
- 抽屈试验
  - 直腿抬高试验
  - 4 字试验
  - 拾物试验
  - 研磨试验
46. 下列对社区卫生服务的描述中, 正确的是
- 社区卫生服务的对象是社区中的患病人群
  - 社区卫生服务的地点是社区医院
  - 社区卫生服务提供的时间, 应适应居民的需求
  - 当居民的健康问题得到解决后, 社区卫生服务即可停止
  - 社区卫生服务的内容是对居民进行健康教育
47. 在  $21^{\circ}\text{C}$  环境下, 人体最主要的散热方式是
- 辐射散热
  - 传导散热
  - 对流散热
  - 蒸发散热
  - 骨骼肌战栗
48. 高浓度降钙素能迅速降低血钙的作用环节是
- 减少肠对钙的吸收
  - 抑制甲状旁腺激素分泌
  - 抑制破骨细胞溶骨活动
  - 刺激成骨细胞成骨活动
  - 抑制肾小管对钙的重吸收
49. 蛋白质紫外线吸收的最大波长是
- 250nm
  - 260nm
  - 270nm
  - 280nm
  - 290nm
50. 不属于一级预防(又称病因预防)的是
- 个人的健康教育
  - 预防接种
  - 医生同患者共同检测疾病
  - 婚前检查
  - 化学预防
51. 正常成年人清醒时闭眼会出现
- $\alpha$  波
  - $\beta$  波
  - $\theta$  波
  - $\delta$  波
  - $\gamma$  波
52. 我国急性胰腺炎的最常见病因是
- 慢性酒精中毒
  - 手术与创伤
  - 高血钙症
  - 胆囊炎, 胆结石
  - 壶腹部肿瘤

53. 描述一组正态分布资料离散程度大小的最佳指标是
- A. 四分位数间距  
B. 标准差  
C. 极差  
D. 离均差平方和  
E. 几何均数
54. 截石位进行肛门检查属内痔好发部位是
- A. 3 点钟  
B. 5 点钟  
C. 9 点钟  
D. 6 点钟  
E. 12 点钟
55. 用阈下刺激即可诱发心肌细胞产生期前收缩的兴奋性周期时相是
- A. 绝对不应期  
B. 相对不应期  
C. 低常期  
D. 局部反应期  
E. 超常期
56. 流行性乙型脑炎的发病年龄主要在
- A. 成年人  
B. 年老体弱者  
C. 可通过母体传播给胎儿  
D. 10 岁以下的儿童  
E. 缺乏年龄特征
57. 6 个月的小儿应完成哪些计划免疫
- A. 卡介苗、乙肝疫苗、流脑疫苗  
B. 脊髓灰质炎三价混合疫苗、百白破混合制剂、麻疹疫苗  
C. 卡介苗、乙肝疫苗、脊髓灰质炎三价混合疫苗、百白破混合制剂  
D. 脊髓灰质炎三价混合疫苗、百白破混合制剂、腮腺炎疫苗  
E. 卡介苗、百白破混合制剂、麻疹疫苗
58. 能够诱导 UDP - 葡糖醛酰基转移酶合成从而减轻黄疸的药物是
- A. 苯巴比妥  
B. 磺胺嘧啶  
C. 氢氯噻嗪  
D. 青霉素  
E. 阿司匹林
59. 不属于医学伦理学原则的是
- A. 尊重原则  
B. 不伤害原则  
C. 知情同意原则  
D. 公正原则  
E. 有利原则
60. 大面积烧伤感染, 脓液呈蓝绿色的是
- A. 金黄色葡萄球菌  
B. 铜绿假单胞菌  
C. 克雷伯杆菌  
D. 大肠埃希菌  
E. 链球菌
61. 近年女性生殖系统恶性肿瘤中死亡率最高的是
- A. 子宫颈癌  
B. 外阴癌  
C. 恶性滋养细胞肿瘤  
D. 子宫内膜癌  
E. 卵巢癌
62. 盲肠癌患者最少见的合并症是
- A. 缺铁性贫血  
B. 大肠梗阻  
C. 右下腹包块  
D. 急性阑尾炎  
E. 原因不明的低热和消瘦
63. 下列不属于腹膜内位器官的是
- A. 卵巢  
B. 回肠  
C. 脾  
D. 空肠  
E. 胰
64. 阴茎癌最好的预防措施是
- A. 每天外阴清洗  
B. 治疗包皮龟头炎  
C. 包皮环切术  
D. 包皮背侧纵切开术  
E. 应用抗生素
65. 促红细胞生成素的作用是促进
- A. 铁的吸收  
B. 早期红系祖细胞增殖、分化  
C. 维生素 B<sub>12</sub> 的吸收  
D. 骨髓造血和红细胞成熟  
E. 雄激素的释放
66. 对于新的或严重的药品不良反应应于发现之日起

- 几天内报告
- A. 及时报告
- B. 3 天
- C. 5 天
- D. 7 天
- E. 15 天
67. 可确诊尖锐湿疣的病理结果是
- A. 猫头鹰细胞
- B. 燕麦细胞
- C. 挖空细胞
- D. 苦否细胞
- E. 镜影细胞
68. 胸部触诊语音震颤减弱的是
- A. 肺梗死
- B. 肺脓肿
- C. 空洞型肺结核
- D. 支气管肺炎
- E. 阻塞性肺气肿
69. 甲状腺功能亢进时, 腹泻的主要发生机制是
- A. 肠蠕动增强
- B. 肠内容物渗透压增高
- C. 肠腔内渗出物增加
- D. 肠液分泌增多
- E. VIP 的作用
70. 无机盐和水溶性维生素含量丰富, 并含有大量的膳食纤维, 该食物可能属于
- A. 谷类
- B. 肉类
- C. 蛋类
- D. 蔬菜
- E. 以上都不是
71. 糖尿病酮症酸中毒时, 患者的呼吸气味是
- A. 腥臭味
- B. 烂苹果味
- C. 蒜臭味
- D. 酒味
- E. 苦杏仁味
72. 卫生资源配置中, 不符合配置原则的是
- A. 效率最大化原则
- B. 公益化原则
- C. 公正原则
- D. 合理化原则
- E. 效益最大化原则

## A2 型选择题 (73—114 题)

## 答 题 说 明

每一道考题下面是以一个小案例出现的, 其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

73. 女, 65 岁。摔伤致右髋关节疼痛, 功能障碍, X 线示右股骨颈头下骨皮质连续性中断, Pauwels 角  $60^\circ$ 。该股骨颈骨折属于
- A. 不完全骨折
- B. 关节外骨折
- C. 外展骨折
- D. 稳定性骨折
- E. 内收骨折
74. 男, 30 岁。晨起四肢无力 1 周, 大小便正常。病前 1 周有“上感”史。查体: 双眼闭合无力, 双侧咽反射迟钝, 四肢肌力 1~2 级, 肌张力低, 腱反射消失, 无明显感觉障碍。最可能的诊断是
- A. 多发性肌炎
- B. 重症肌无力
- C. 吉兰-巴雷综合征
- D. 周期性瘫痪
- E. 急性脊髓炎
75. 女, 50 岁。畏寒、消瘦、食欲减退、毛发脱落 10 年余。有产后大出血史。查体: 水肿, 皮肤粗糙, 反应迟钝, 心率 56 次/分, 律齐。实验室检查: 血  $FT_3$ 、 $FT_4$  降低、TSH 升高。考虑主要诊断为
- A. 原发性甲状腺功能减退症
- B. 垂体瘤
- C. 甲状腺肿瘤
- D. Sheehan 综合征
- E. 原发性慢性肾上腺皮质功能减退症
76. 男, 65 岁。因肝硬化伴上消化道大出血入院。现患者在病房大喊大叫, 随地大小便, 有扑翼样震颤。考虑为
- A. 肝性脑病

- B. 中枢神经系统感染  
C. 原发性肝癌  
D. 肝肾综合征  
E. 肝肺综合征
77. 男, 51 岁。胸骨后剧烈疼痛伴大汗淋漓 6 小时。查体: BP 80/40mmHg, 心率 134 次/分, 面色苍白, 四肢发冷。心电图示广泛心肌梗死。该患者最理想有效治疗措施是  
A. 毛花苷 C 强心  
B. 多巴胺升压  
C. 尿激酶溶栓  
D. 主动脉内球囊反搏术  
E. 直接 PTCA 术
78. 女, 52 岁。发热、咳嗽 2 天。查体(坐位): T 37.8°C, 右侧胸廓略饱满, 右下肺第 4 前肋间以下叩诊呈实音, 呼吸音明显减弱。该患者最可能出现的其他体征是  
A. 右下肺可闻及湿啰音  
B. 右下肺可闻及胸膜摩擦音  
C. 气管向右侧移位  
D. 右下肺语音共振减弱  
E. 右下肺可闻及支气管呼吸音
79. 一足月儿, 经阴道分娩, 生后 1min Apgar 评分, 见皮肤有很多淤血, 心率 80 次/min, 弹足底有皱眉反应, 四肢略屈曲, 无呼吸。应评几分  
A. 1 分  
B. 2 分  
C. 3 分  
D. 4 分  
E. 5 分
80. 正常婴儿, 体重 7.5kg, 身长 68cm。前囟 1.0cm, 头围 44cm。出牙 4 个。能独坐, 并能以拇、示指拿取小球。该小儿最可能的月龄是  
A. 8 个月  
B. 24 个月  
C. 18 个月  
D. 12 个月  
E. 5 个月
81. 女, 33 岁。2 天前突发胸壁背部痛, 继而下肢无力、麻木、排尿困难, 无视物成双、饮水呛咳、吞咽困难。起病前 1 周有“感冒”病史。查体: T 36.8°C, R 18 次/分, P 75 次/分。双下肢肌张力减低, 腱反射消失, 病理反射(-)。最可能的诊断是  
A. 吉兰-巴雷综合征  
B. 髓内肿瘤  
C. 髓外肿瘤  
D. 急性脊髓炎  
E. 颈椎病
82. 男, 20 岁。因右面部被刀划伤 13 小时就诊。查体: 右面部有 4cm 长伤口, 深及骨膜, 有血痂, 伤口周边无红肿。宜采取的处理方法是  
A. 清创后旋转橡胶片引流  
B. 局部应用抗生素  
C. 清创后一期缝合  
D. 清创后二期缝合  
E. 伤口敷料覆盖
83. 在一项队列研究中, 非暴露组 150 名中 15 人患高血压, 暴露组 200 人中 30 人患高血压。归因危险度为  
A. 0.15  
B. 0.1  
C. 1.5  
D. 0.05  
E. 0.25
84. 男, 70 岁。被诊断为抑郁障碍。某天得知其一位老朋友是心理治疗师, 心想熟人好办事, 遂向其求助, 但却遭到了拒绝。该心理治疗师拒绝提供服务所依据的心理治疗原则为  
A. 回避原则  
B. 中立原则  
C. 真诚原则  
D. 耐心原则  
E. 保密原则
85. 男, 42 岁。乏力、低热 3 个月, 青霉素、环丙沙星治疗 3 周症状无缓解, 既往有静脉吸毒史。最可能感染的病原体是  
A. 铜绿假单胞菌  
B. 链球菌  
C. 支原体  
D. 沙眼衣原体  
E. 病毒感染
86. 女, 39 岁。瘢痕子宫, 妊娠 39 周, 规律宫缩 9 小时。宫口 6cm, 先露 S<sup>+</sup>, 突然腹痛加剧。查体: T 37.5°C, P 100 次/分, BP 90/60mmHg, 宫口 4cm, 先露 S<sup>-2</sup>, 胎心率 60 次/分, 2 分钟后胎心消失。最可能的诊断是

- A. 子宫破裂  
B. 羊水栓塞  
C. 胎盘早剥  
D. 腹腔感染  
E. 先兆子宫破裂
87. 女, 25 岁。尿频、尿急、尿痛 1 天。查体: T 37.5°C, 肾区叩击痛阴性。血常规: WBC  $12.3 \times 10^9/L$ , N 0.84, 尿常规: RBC 8 ~ 10/HP, WBC 30 ~ 40/HP, 尿蛋白(-)。最可能的诊断是  
A. 急性胰腺炎  
B. 急性肾小球肾炎  
C. 急性膀胱炎  
D. 急性肾盂肾炎  
E. 急性胃肠炎
88. 男, 55 岁。心房颤动 5 年, 1 年前曾发作语言不利伴肢体活动障碍。该患者长期抗栓治疗的药物首选是  
A. 阿司匹林  
B. 尿激酶  
C. 低分子肝素  
D. 潘生丁  
E. 华法林
89. 男, 55 岁。背部肿痛 5 天。疼痛逐渐加重, 伴畏寒、发热。既往糖尿病病史 10 年。查体: T 38.5°C, BP 120/80mmHg, P 90 次/分, R 18 次/分, 背部红肿, 范围约 5cm, 边界不清, 中央多个脓点。双肺呼吸音清, 未闻及干、湿啰音, 心律齐。该患者最可能的诊断是  
A. 皮脂腺囊肿感染  
B. 痈  
C. 疖  
D. 急性蜂窝织炎  
E. 丹毒
90. 已知某省山区、丘陵、湖区婴幼儿体格发育有较大的差异, 现需制订该省婴幼儿体格发育有关指标的正常范围, 调查设计最好采取  
A. 机械抽样  
B. 分层抽样  
C. 单纯随机抽样  
D. 整群抽样  
E. 系统抽样
91. 女, 3 岁。因生长迟缓伴智力低下就诊。查体: 身高 75cm, 体重 13kg, 表情呆板, 毛发稀少, 皮肤粗糙, 塌鼻梁, 舌头宽厚, 心音低钝, 腹胀, 有脐疝。该患儿最可能的诊断是  
A. 先天性甲状腺功能减退症  
B. 苯丙酮尿症  
C. 侏儒症  
D. 21-三体综合征  
E. 精神发育迟滞
92. 女, 35 岁。停经 3 个月, 阴道不规则流血 3 天。妇科检查: 子宫如 4 个月妊娠大小。B 超示宫腔内落雪征。首先考虑为  
A. 自然流产  
B. 双胞胎妊娠  
C. 妊娠合并子宫肌瘤  
D. 葡萄胎  
E. 羊水过多
93. 女, 36 岁。结婚 8 年未孕。月经规律, 周期 22 天, 经期 5 ~ 6 天, 无痛经。基础体温为双相型, 高温相为 8 天。月经来潮后 6 小时子宫内膜活检。病理检查结果最可能是  
A. 萎缩型子宫内膜  
B. 分泌期子宫内膜腺体分泌不良  
C. 分泌期与增殖期内膜并存  
D. 子宫内膜单纯性增生  
E. 增殖期子宫内膜
94. 女, 66 岁。因剧烈胸痛 5 小时入院治疗。心电图示窦性心律, 心率 55 次/分, II、III、aVF 导联 ST 段抬高 0.3mV, 其余导联 ST 段正常。介入治疗前植入临时起搏器起搏心室, 以 60 次/分频率起搏时, 监测动脉血压由 100/70mmHg 降低至 85/60mmHg。导致这种血压变化的最可能原因是  
A. 起搏心律时阻力血管扩张致血压下降  
B. 合并右心室梗死, 右室排血量减少致左室充盈减少  
C. 起搏心律时心率增快, 舒张期缩短导致回心血量减少  
D. 起搏心律时心肌收缩力较弱致心排血量降低  
E. 起搏时增加心房收缩对心室的充盈作用, 右室充盈减少
95. 男, 70 岁。吞咽困难 15 天。查体无明显阳性体征。上消化道钡餐造影示食管中段黏膜紊乱, 管壁僵硬, 管腔狭窄。该患者最可能的初步诊断是  
A. 食管炎  
B. 食管憩室

- C. 贲门失弛缓症  
D. 食管癌  
E. 食管平滑肌瘤
96. 女, 50 岁。反复低热 1 年, 伴四肢大小关节肿痛。WBC  $8.0 \times 10^9/L$ , Hb 100g/L, ANA(-), RF(+). 经多种抗生素正规治疗无效, 可能的诊断是
- A. 风湿性关节炎  
B. 系统性红斑狼疮  
C. 骨关节炎  
D. 类风湿性关节炎  
E. 结核菌感染引起的关节炎
97. 男, 52 岁。上腹部疼痛反复发作 5 年, 近 7 天出现腹胀, 呕吐。经 X 线钡剂检查诊断十二指肠溃疡伴幽门梗阻。最适宜的手术方式是
- A. 毕 I 式胃大部切除术  
B. 毕 II 式胃大部切除术  
C. 迷走神经干切断术  
D. 胃空肠吻合术  
E. 选择性胃迷走神经切断术
98. 女, 77 岁。反复咳嗽咳痰 30 年, 近 5 年来长期夜间家庭氧疗。1 周前因受凉后出现喘息, 夜间入睡困难。昨夜自服“舒乐安定(艾司唑仑)”2 片, 并将吸氧流量提高至 4L/min, 自觉喘息症状有所改善。今晨家属发现其呼之不应。入院查体: 轻度昏迷, 球结膜水肿, 口唇无发绀。双肺呼吸音低。双侧 Babinski 征(±)。该患者最可能出现的问题是
- A. 电解质紊乱  
B. 氧中毒  
C. 肺性脑病  
D. 镇静剂中毒  
E. 脑梗死
99. 女, 51 岁。乙型肝炎病史 30 余年。2 小时前进食烧饼后突然出现呕血, 量约 800ml。查体未发现全身皮肤、黏膜黄染和腹水。如果该患者需要接受急诊手术, 最佳手术方式是
- A. 经颈静脉肝内门体分流术  
B. 非选择性门体分流术  
C. 选择性门体分流术  
D. 贲门周围血管离断术  
E. 脾切除术
100. 男, 35 岁。发热、气短 15 天, 伴明显刺激性咳嗽, 咽痛、头痛。白细胞增高。胸部 X 线示双下肺点片状浸润影。最有可能的诊断是
- A. 干酪样肺炎  
B. 葡萄球菌肺炎  
C. 肺炎链球菌肺炎  
D. 支原体肺炎  
E. 肺孢子菌肺炎
101. 男, 40 岁。反复上腹疼痛 5 年余, 平卧时加重, 弯腰可减轻。查体: 上腹部轻压痛, 腹部 X 线示左上腹部钙化。可能的诊断是
- A. 慢性胃炎  
B. 慢性胆囊炎  
C. 慢性胰腺炎  
D. 慢性十二指肠球炎  
E. 慢性肝炎
102. 男, 30 岁。发热、畏寒 3 天, 头痛, 食欲不振, 肛门灼痛, 排便、行走时加剧, 坐卧不安。肛门指诊检查: 患侧丰满, 压痛明显, 有波动感。最可能的诊断是
- A. 肛门括约肌间隙脓肿  
B. 直肠下黏膜脓肿  
C. 直肠后间隙脓肿  
D. 坐骨直肠间隙脓肿  
E. 坐骨直肠间隙脓肿穿向肛提肌以上
103. 女, 38 岁。2 年前诊断为原发性慢性肾上腺皮质功能减退症, 长期口服氢化可的松(30mg/d)替代治疗。近 2 天发热 38℃, 咽痛。目前氢化可的松应
- A. 改用等效量的地塞米松  
B. 因有感染而暂时停用  
C. 剂量减少 1/2  
D. 剂量维持不变  
E. 剂量增加为 2 倍~3 倍
104. 男, 28 岁。因间断发热 5 天, 于 8 月底来诊。6 天前由广州到哈尔滨, 次日出现寒战、发热、头痛, 服退热药热退, 2 天后再次高热, 持续数小时, 大汗后退热, 伴乏力, 精神差。实验室检查: WBC  $6.5 \times 10^9/L$ , L 0.40。可能的诊断是
- A. 急性血吸虫病  
B. 流行性乙型脑炎  
C. 败血症  
D. 伤寒  
E. 疟疾
105. 男, 28 岁。左下肢疼痛 6 个月, 加重 1 个月。初起长

时间行走后加重,休息后可缓解。1个月前开始,休息时亦觉疼痛。曾间断发生左下肢不同部位红线状病灶。无高血压、糖尿病病史,吸烟10年。查体:T 36.5°C, P 18次/分, BP 120/80mmHg,心肺腹未见异常,左足苍白,左足背动脉搏动消失,左股、腘动脉可触及搏动。左下肢病变应首先考虑的诊断为

- A. 急性动脉栓塞
- B. 血栓性浅静脉炎
- C. 动脉硬化性闭塞症
- D. 深静脉血栓形成
- E. 血栓闭塞性脉管炎

106. 男,35岁。间断血压增高伴心悸3个月。查体:正力体型,双上肢血压200/130mmHg,双肺呼吸音清,心率78次/分,律齐,腹软,腹部未闻及杂音。血压增高时测血游离间苯肾上腺素、去甲肾上腺素和尿儿茶酚胺显著增高。血钾和肌酐正常,尿常规正常。CT示双肾、肾上腺和肾动脉未见异常。该患者需首先考虑的疾病是

- A. 肾动脉狭窄
- B. 嗜铬细胞瘤
- C. 皮质醇增多症
- D. 原发性醛固酮增多症
- E. 肾上腺皮质功能减退症

107. 男,14岁。右大腿深部巨大血管瘤,术后情况良好,伤口一期愈合。拆线后下床活动5分钟后,突然晕倒,抢救无效死亡。应考虑为

- A. 脑血管意外
- B. 心肌梗死
- C. 休克致死
- D. 肺动脉栓塞
- E. 脂肪栓塞

108. 女,20岁。头痛2年,呈发作性双颞部剧烈头痛,与月经有明显关系,发作后,常有疲劳,倦怠,无力,食欲差。该患者预防治疗应选择的药物是

- A. 苯妥英钠
- B. 卡马西平
- C. 丙戊酸钠
- D. 苯巴比妥
- E. 托吡酯

109. 女,33岁。反复便秘、腹痛10年。便前腹痛、腹部不适,便后缓解;工作紧张时症状加重。无便血及消瘦。睡眠差。最有可能的诊断是

- A. 肠易激综合征
- B. 克罗恩病
- C. 肠结核
- D. 结肠癌
- E. 溃疡性结肠炎

110. 某大型企业计划在自然疫源地兴建旅游建设项目,在征求意见时,有专家提醒,根据《传染病防治法》规定,应当事先由法定单位对该项目施工环境进行卫生调查。该法定单位是

- A. 省级以上旅游主管部门
- B. 省级以上疾病预防控制机构
- C. 国务院卫生行政主管部门
- D. 省级以上环境保护主管部门
- E. 省级以上环境监测评价机构

111. 女,40岁。车祸致左枕部着地,当即意识丧失。送至附近医院途中,右侧肢体间断性抽搐,伴喷射状呕吐3次。查体:BP 160/95mmHg, P 56次/分,浅昏迷,躁动,右侧瞳孔直径约5mm,左侧3mm;对光反射:左侧存在,右侧消失。左侧肌力3级,右侧肌力5级。左枕部头皮血肿,颈项强直。最主要的诊断是

- A. 右额急性硬脑膜下血肿伴左小脑幕切迹疝
- B. 右额急性硬脑膜下血肿伴右小脑幕切迹疝
- C. 左额广泛脑挫裂伤伴左小脑幕切迹疝
- D. 左额急性硬脑膜下血肿伴左小脑幕切迹疝
- E. 左额急性硬脑膜下血肿伴右小脑幕切迹疝

112. 男,66岁。因右侧腹股沟斜疝嵌顿9小时入院。急诊手术中发现嵌顿入疝囊的回肠有约50%坏死,行坏死回肠切除肠吻合术。对伤口进行彻底清洗后,无明显炎症表现。疝处理应首选

- A. 单纯疝囊高位结扎术
- B. Ferguson法疝修补术
- C. Bassini法疝修补术
- D. Halsted法疝修补术
- E. 无张力疝修补术

113. 女,38岁。呕血1小时,患肝硬化门静脉高压症多年。查体:巩膜黄染,中等量腹水。血清蛋白25g/L。首先应选择的治疗方法是

- A. 断流手术
- B. 选择性门体分流术
- C. 三腔二囊管压迫止血
- D. 非选择性门体分流术
- E. 经颈静脉肝内门体分流术

114. 男, 70 岁。人工膝关节置换术后膝关节周围加压包扎。1 天后发现右足不能背屈, 跖屈正常, 足背动脉搏动正常。最可能的原因是
- A. 腓总神经损伤

- B. 骨筋膜室综合征  
C. 坐骨神经损伤  
D. 胫神经损伤  
E. 深静脉血栓

A3/A4 型选择题 (115—139 题)

答 题 说 明

以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道试题。请根据案例提供的信息, 在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(115—117 题共用题干)

男, 2 岁。1 个月来食欲减退、消瘦伴乏力, 近 2 周低热、盗汗、干咳。2 个月前曾患麻疹。查体: 消瘦, 未见瘢痕, 颈部可触及数个肿大淋巴结, 质硬, 无明显压痛, 心脏检查未见异常, 右肺可闻及少许干湿啰音, 肝肋下 3cm, 脾不大。

115. 最可能的诊断是

- A. 原发型肺结核  
B. 支气管肺炎  
C. 支气管淋巴结结核  
D. 浸润型肺结核  
E. 颈部淋巴结结核 + 支气管淋巴结结核

116. 首选的检查是

- A. 淋巴结活检  
B. 肺炎支原体抗体检测  
C. EBV 特异性抗体检测  
D. 血常规  
E. 胸部 X 线

117. 主要治疗药物是

- A. 阿昔洛韦  
B. 异烟肼 + 利福平  
C. 异烟肼 + 泼尼松  
D. 头孢曲松  
E. 阿奇霉素

(118—119 题共用题干)

女, 30 岁。痛经进行性加重 7 年, 婚后 4 年未孕。查体: 子宫后位, 大小正常, 子宫左后方可触及大小约 7cm 的囊性包块, 张力比较大, 触痛, 子宫右后方触及类似包块, 大小约 6cm。血 CA125 65U/ml, 抗子宫内膜抗体 (+)。

118. 首先考虑的诊断是

- A. 盆腔结核

- B. 盆腔炎性包块  
C. 转移性卵巢肿瘤  
D. 子宫内膜异位症  
E. 卵巢上皮癌

119. 术后拟给予药物治疗, 最适合的药物是

- A. 抗结核药物  
B. 抗生素  
C. 免疫调节剂  
D. GnRH- $\alpha$   
E. 化疗药物

(120—122 题共用题干)

男, 69 岁。咳嗽、咳痰 5 个月, 呈刺激性咳嗽, 伴有痰中带血, 不伴发热、盗汗, 吸烟史 30 余年, 胸部 X 线示右肺门处团块状影。

120. 该患者最可能的检查是

- A. 支气管扩张  
B. 肺结核  
C. 急性支气管炎  
D. 肺脓肿  
E. 肺癌

121. 为明确诊断, 最好的检查是

- A. 胸部 CT  
B. 胸部 MRI  
C. 胸壁穿刺活检  
D. 肿瘤标记物检测  
E. 纤维支气管镜 + 活组织细胞学检查

122. 经抗感染治疗阴影不吸收。首选的治疗方案是

- A. 继续抗感染治疗  
B. 抗炎止血治疗  
C. 手术治疗  
D. 抗结核治疗  
E. 免疫治疗



## (123—124 题共用题干)

女,6岁。发热2个月,心悸1个月。并左膝关节痛,双肘、腕关节红肿,偶有胸闷,口服抗生素疗效不佳。查体:T 38.2℃,心率134次/分,第一心音减弱,心尖区可闻及吹风样收缩期杂音,偶可闻及早搏。左膝、双肘、腕关节红肿,有触痛。实验室检查:WBC  $12 \times 10^9/L$ ,N 0.8,ESR 40mm/h,血ASO增高。心电图示一度房室传导阻滞,ST段下移,T波平坦。

123. 最可能的诊断是

- A. 风湿热
- B. 结核性关节炎
- C. 幼年特发性关节炎
- D. 化脓性关节炎
- E. 风湿性心脏瓣膜病

124. 该患儿需绝对卧床休息的时间是

- A. 4周
- B. 3周
- C. 6周
- D. 8周
- E. 10周

## (125—126 题共用题干)

男,26岁。在气温34℃时,负重跑步5公里后突发意识不清伴抽搐2小时。查体:T 41.5℃,BP 100/42mmHg,P 166次/分,R 28次/分,瞳孔等大等圆,心尖部第一心音低钝,四肢肌张力高。

125. 最有可能的诊断是

- A. 热痉挛
- B. 热衰竭
- C. 低血糖
- D. 热射病
- E. 脱水

126. 最关键的治疗措施是

- A. 应用抗癫痫药物
- B. 应用镇静药
- C. 降温治疗
- D. 氧疗
- E. 应用甘露醇

## (127—128 题共用题干)

男,35岁。3月来双下肢无力,双下肢麻木逐渐发展到腰部,背后疼痛且咳嗽时加剧。查体:左半侧T<sub>5</sub>下痛温觉消失;右下肢肌力Ⅲ°,腱反射亢进,Babinski征阳性,右下肢足趾振动觉位置觉消失。

127. 病变脊髓处,MRI表现为

- A. 脊髓呈梭形膨大,广泛低信号
- B. 正常脊髓
- C. 脊髓不膨大,髓内广泛点状高信号
- D. 脊髓外高信号肿块
- E. 中央管扩大呈空腔

128. 该脊髓损害为

- A. 脊髓半切综合征
- B. 脊髓横贯性损害
- C. 脊髓后角损害
- D. 脊神经根损害
- E. 脊髓后索和侧索联合损害

## (129—130 题共用题干)

男,72岁。咳嗽、咳痰30年,加重伴气短10天。查体:神志清楚,口唇发绀,桶状胸,双肺闻及少许干湿啰音。胸部X线示双肺纹理增粗紊乱。血气分析示PaO<sub>2</sub> 55mmHg,PaCO<sub>2</sub> 55mmHg。

129. 最可能的诊断是

- A. 严重肺部感染
- B. 间质性肺疾病
- C. 急性肺栓塞
- D. COPD 并发Ⅱ型呼衰
- E. 肺水肿

130. 该患者发生呼衰的机制是

- A. 肺内分流
- B. 限制性通气功能障碍
- C. 肺通气功能障碍
- D. 氧耗量增加
- E. 弥散功能障碍

## (131—132 题共用题干)

女,1岁。急起高热、流涎、厌食。查体:见咽部充血,咽腭弓、悬雍垂、软腭等处可见2~4mm大小的疱疹,心肺(-)。

131. 最可能的诊断是

- A. 疱疹性口腔炎
- B. 鹅口疮
- C. 猩红热
- D. 咽-结合膜热
- E. 疱疹性咽峡炎

132. 导致患儿发病的病原是

- A. 柯萨奇病毒

- B. 带状疱疹病毒
- C. 腺病毒
- D. 人类疱疹病毒 6 型
- E. 呼吸道合胞病毒

(133—134 题共用题干)

男, 22 岁。上课时突然手中钢笔掉落, 两眼向前瞪视, 呼之不应, 持续数秒钟。过后对上述情况全无记忆, 以后反复有类似发作, 有时 1 天发作几次。

133. 本题患者诊断为
- A. 癔症
  - B. 失神发作
  - C. 局限性癫痫
  - D. 复杂部分性发作
  - E. 肌阵挛发作

134. 发作首选

- A. 丙戊酸钠
- B. 卡马西平
- C. 乙琥胺
- D. 苯妥英钠
- E. ACTH

(135—137 题共用题干)

女, 25 岁。发热伴下肢和腹部皮肤瘀斑 5 天。查体: 双下肢和腹部皮肤有多处瘀斑, 双侧颈部、腋窝和腹股沟可触及淋巴结肿大, 活动无压痛, 最大者为  $2.0\text{cm} \times 2.5\text{cm}$ , 胸骨压痛 (+), 腹软, 肝肋下 1.5cm, 脾肋下 2cm。化验: Hb  $78\text{g/L}$ , WBC  $18 \times 10^9/\text{L}$ , 分类可见原始和幼稚细胞,  $\text{Plt } 25 \times 10^9/\text{L}$ , 网织红细胞 0.002。

135. 该患者最可能的诊断是

- A. 急性淋巴细胞白血病
- B. 非霍奇金淋巴瘤
- C. 急性粒细胞白血病

- D. 霍奇金淋巴瘤
- E. 系统性红斑狼疮

136. 为明确诊断, 首选的检查是

- A. 骨髓细胞学检查
- B. 淋巴结活检
- C. 骨髓活检
- D. 腹部 B 超
- E. ANA 谱

137. 明确诊断后, 首选的治疗措施是

- A. ABVD 方案化疗
- B. VDLP 方案化疗
- C. 给予大剂量糖皮质激素
- D. DA 方案化疗
- E. CHOP 方案化疗

(138—139 题共用题干)

男, 45 岁。1 个月前出现腹胀, 无呕吐, 伴发热, 体温最高  $38^\circ\text{C}$ , 夜间盗汗, 12 小时前突发腹部绞痛, 未排气排便。查体: T  $37.7^\circ\text{C}$ , P 88 次/分, R 16 次/分, BP  $110/80\text{mmHg}$ , 心肺查体未见异常, 腹部呈揉面感, 可见肠型及蠕动波, 肠鸣音亢进。

138. 该患者最可能的诊断是

- A. 淋巴瘤并肠梗阻
- B. 家族性息肉病
- C. 溃疡性结肠炎
- D. 结肠癌并肠梗阻
- E. 结核性腹膜炎并肠梗阻

139. 目前该患者首选的检查是

- A. 血沉
- B. 结肠镜
- C. 立位腹部 X 线平片
- D. 腹部 B 超
- E. 腹部 CT

B1 型选择题 (140—150 题)

答 题 说 明

以下提供若干组试题, 每组试题共用列在试题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(140—141 题共用备选答案)

- A. 缺铁性贫血
- B. 巨幼细胞性贫血

- C. 骨髓增生异常综合征
- D. 再生障碍性贫血
- E. 多发性骨髓瘤

140. 正细胞贫血可见于

141. 小细胞低色素性贫血可见于

(142—143 题共用备选答案)

- A. 不规则深大溃疡
- B. 多发浅溃疡
- C. 纵行溃疡
- D. 环形溃疡
- E. 烧瓶样溃疡

142. 克罗恩病的肠道溃疡形态是

143. 溃疡性结肠炎最常出现的肠道溃疡形态是

(144—145 题共用备选答案)

- A. 膝关节
- B. 肘关节
- C. 前臂
- D. 上臂
- E. 大腿

144. 上述疾病中,最容易并发骨筋膜室综合征的部位是

145. 上述疾病中,最容易发生损伤性骨化的部位是

(146—148 题共用备选答案)

- A. 肩关节脱位
- B. 儿童锁骨青枝骨折
- C. 神经根型颈椎病
- D. 桡骨头半脱位
- E. 桡骨远端骨折

146. 常用手法复位固定的是

147. 可仅用三角巾固定的是

148. 常用悬吊牵引治疗的是

(149—150 题共用备选答案)

- A. PR 间期进行性缩短,直至一个 P 波受阻不能下传到心室
- B. 相邻 RR 间距进行性延长,直至一个 P 波受阻不能下传到心室
- C. PR 间期进行性延长,直至一个 P 波受阻不能下传到心室
- D. PR 间期  $> 0.20$  秒
- E. PR 间期固定, P 波间断受阻不能下传到心室

149. 一度房室传导阻滞的心电图特征是

150. 二度 I 型房室传导阻滞的心电图特征是



关注公众号“山西金英杰医考”，获取更多临床医考资料

## 第四单元

### A1 型选择题 (1—87 题)

#### 答 题 说 明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 胎儿在子宫内急性缺氧初期表现为胎动  
A. 减弱  
B. 增强  
C. 次数减少  
D. 频繁  
E. 次数稍增多
2. 产后出血是指阴道流血量在胎儿娩出后 24 小时内超过  
A. 300ml  
B. 400ml  
C. 500ml  
D. 600ml  
E. 700ml
3. 下列哪种药物属于肝药酶抑制药  
A. 苯巴比妥  
B. 水合氯醛  
C. 西咪替丁  
D. 利福平  
E. 卡马西平
4. 滴虫性阴道炎主要的传播途径是  
A. 性传播  
B. 血液传播  
C. 母婴传播  
D. 吸毒传播  
E. 呼吸道传播
5. 佝偻病激期(活动期)临床表现主要是  
A. 生长中的骨骼改变、肌肉松弛和神经兴奋性改变  
B. 神经症状、骨骼改变  
C. 易激惹、烦躁、多汗、枕部秃发  
D. 颅骨软化、鸡胸、X 形腿  
E. 骨缝、前囟、后囟闭合及出牙延迟
6. 婴儿每天需热量与营养素较成人相对高,主要是由  
于小儿  
A. 基础代谢所需较高  
B. 生长发育所需较高  
C. 活动量大所需较高  
D. 食物特殊动力作用所需较高  
E. 消化吸收功能差,丢失较多
7. 以肾小球壁层上皮细胞增生为主的肾炎类型是  
A. 膜增生性肾小球肾炎  
B. 微小病变型肾小球肾炎  
C. 新月体性肾小球肾炎  
D. 系膜增生性肾小球肾炎  
E. 急性弥漫性增生性肾小球肾炎
8. 下列提示胎盘功能正常的情况是  
A. 血清胎盘生乳素突然降低 50%  
B. 胎动 < 10 次/12 小时  
C. OCT 试验阳性  
D. 尿雌激素/肌酐比值 > 15  
E. NST 试验无反应型
9. 百白破疫苗初种年龄是  
A. 2 个月  
B. 3 个月  
C. 8 个月  
D. 1 个月  
E. 生后 2~3 天
10. 成分输血的优点不包括  
A. 容易制备  
B. 疗效好  
C. 纯度高  
D. 便于保存  
E. 保护血液资源
11. 足月新生儿病理性黄疸特点,错误的是  
A. 血清总胆红素 > 221 μmol/L

- B. 产后 24 小时出现黄疸  
 C. 黄疸持续时间 >2 周  
 D. 黄疸退而复现  
 E. 血清结合胆红素 <34 $\mu\text{mol/L}$
12. 极低出生体重儿标准是指出生体重不足  
 A. 2 000g  
 B. 800g  
 C. 1 500g  
 D. 1 000g  
 E. 2 500g
13. 左侧小脑幕切迹疝最确切的解释是  
 A. 左侧基底节受压左移  
 B. 脑干受压左移  
 C. 左侧颞叶钩回通过小脑幕切迹被推挤至幕下  
 D. 左侧小脑幕的移位  
 E. 左侧小脑幕挤压脑干
14. 脑干胶质瘤最早临床表现是  
 A. 颜神经麻痹  
 B. 脑积水  
 C. 头痛  
 D. 癫痫  
 E. 视神经盘水肿
15. 下列关于羊水的叙述,正确的是  
 A. 妊娠中期主要来自胎盘  
 B. 母体与羊水的交换主要通过脐带  
 C. 胎儿的吞咽可以使羊水量趋于平衡  
 D. 早期羊水主要来自胎儿尿液  
 E. 妊娠晚期胎儿的肝脏参与羊水的生成
16. 新生儿 Apgar 评分指标不包括  
 A. 体温  
 B. 呼吸  
 C. 心率  
 D. 肌张力  
 E. 皮肤颜色
17. 对先天性巨结肠,既简单又具有诊断价值的检查是  
 A. 钡剂灌肠  
 B. 直肠黏膜活组织检查  
 C. 肌电图检查  
 D. 腹部立位 X 线平片  
 E. 直肠肛门测压
18. 子宫颈癌的始发部位通常是  
 A. 子宫颈组织学内口区  
 B. 子宫颈管柱状上皮区  
 C. 子宫颈移行带区  
 D. 子宫颈解剖学内口区  
 E. 宫颈鳞状上皮区
19. 左向右分流型先天性心脏病出现显著肺动脉高压时主要改变是  
 A. 左心室增大  
 B. 右心室增大  
 C. 左心房增大  
 D. 右心房增大  
 E. 左心房,左心室增大
20. 下列属于选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂的是  
 A. 吗氯贝胺  
 B. 氟米帕明  
 C. 米安色林  
 D. 马普替林  
 E. 帕罗西汀
21. 产后出血最常见的病因是  
 A. 多胎  
 B. 羊水过多  
 C. 妊娠高血压疾病  
 D. 宫缩乏力  
 E. 巨大胎儿
22. 颅内肿瘤若表现为精神症状,常考虑肿瘤部位为  
 A. 小脑  
 B. 顶叶  
 C. 额叶  
 D. 枕叶  
 E. 岛叶
23. 属于盆底内层(即盆膈)肌肉的是  
 A. 球海绵体肌  
 B. 会阴深横肌  
 C. 肛提肌  
 D. 坐骨海绵体肌  
 E. 肛门外括约肌
24. 属于盆腔炎性疾病诊断特异性标准的是  
 A. 宫颈举痛或子宫压痛或附件区压痛  
 B. 实验室证实的宫颈淋病奈瑟菌或衣原体阳性  
 C. 宫颈或阴道异常黏液脓性分泌物  
 D. 阴道分泌物生理盐水涂片见大量白细胞  
 E. 经阴道超声或磁共振检查示输卵管积液

25. 不符合小儿先天性肥厚性幽门狭窄临床特点的是
- A. 呕吐物含胆汁
  - B. 多于生后 2~4 周发病
  - C. 右季肋区下可触及橄榄样肿块
  - D. 少数患者有黄疸
  - E. 常见左向右的胃蠕动波
26. 躯体疾病所致精神障碍处理原则, 错误的是
- A. 首先必须治疗引起精神障碍的原发躯体疾病
  - B. 支持疗法包括维持水电解质平衡、充足的营养供应等
  - C. 护理包括安静、安全的环境和防止意外发生等
  - D. 对精神症状的控制应遵从大剂量、足疗程的原则
  - E. 要考虑治疗药物对患者的副作用
27. 骨囊肿的典型 X 线表现是
- A. 葱皮样骨膜反应
  - B. 骨质破坏, 死骨形成
  - C. 日光放射状骨膜反应
  - D. 肥皂泡样骨质反应
  - E. 干骺端圆形边界清楚的溶骨性病灶
28. 按计划免疫接种程序, 脊髓灰质炎疫苗的复种时间为
- A. 6 个月
  - B. 1 岁
  - C. 2 岁
  - D. 3 岁
  - E. 4 岁
29. 吉兰 - 巴雷综合症的脑脊液蛋白 - 细胞分离是指
- A. 蛋白含量正常, 细胞数目正常
  - B. 蛋白含量增高, 细胞数目正常
  - C. 蛋白含量增高, 细胞数目降低
  - D. 蛋白含量降低, 细胞数目增高
  - E. 蛋白含量正常, 细胞数目增高
30. 外阴阴道念珠菌病最主要传染途径是
- A. 性交传染
  - B. 血行传染
  - C. 间接传染
  - D. 直接传染
  - E. 内源性感染
31. 苯丙酮尿症患儿主要的神经系统异常表现是
- A. 肌张力增高
  - B. 行为异常
  - C. 智能发育落后
  - D. 惊厥
  - E. 腱反射亢进
32. 健康育龄妇女出现恶心、食欲减退等消化道症状, 问诊时不应忽视的是
- A. 胃炎病史
  - B. 肝炎病史
  - C. 传染病史
  - D. 不洁饮食史
  - E. 月经史
33. 颅后窝骨折的临床表现是
- A. 脑脊液鼻漏
  - B. Battle 征
  - C. 视神经损伤
  - D. 眼镜征
  - E. 嗅神经损伤
34. 早产最常见的病因是
- A. 遗传因素
  - B. 头盆不称
  - C. 子宫畸形
  - D. 子痫前期
  - E. 下生殖道感染
35. 结核性心包炎初期最关键的治疗是
- A. 口服泼尼松
  - B. 抗结核治疗
  - C. 营养支持治疗
  - D. 心包穿刺引流
  - E. 口服利尿药
36. 抢救羊水栓塞的首要措施是
- A. 切除子宫
  - B. 纠正肾功能衰竭
  - C. 立即终止妊娠
  - D. 纠正呼吸循环衰竭
  - E. 纠正 DIC 及继发纤溶
37. 滴虫性阴道炎的治愈标准是
- A. 临床症状消失
  - B. 局部用药 3 个疗程
  - C. 连续 3 次月经后检查滴虫阴性
  - D. 连续 3 次月经前检查滴虫阴性
  - E. 治疗后悬滴法检查滴虫阴性
38. 与中骨盆狭窄无关的是
- A. 坐骨切迹宽度
  - B. 骶尾关节活动度

- C. 坐骨棘间径  
D. 骨盆侧壁倾斜度  
E. 骶骨弯曲度
39. 化脓性脑膜炎合并硬膜下积液, 常见的病原菌是  
A. 金黄色葡萄球菌  
B. 大肠杆菌  
C. B 族溶血性链球菌  
D. 流感嗜血杆菌  
E. 绿脓杆菌(铜绿假单胞菌)
40. 骨折早期常见的并发症是  
A. 缺血性肌挛缩  
B. 感染  
C. 血管、内脏和神经损伤  
D. 损伤性骨化  
E. 急性骨萎缩
41. 传染性单核细胞增多症血象的突出变化是  
A. 白细胞正常伴异型淋巴细胞  
B. 淋巴细胞增多伴异型淋巴细胞  
C. 粒细胞增多伴异型淋巴细胞  
D. 单核细胞增多伴异型淋巴细胞  
E. 血小板增多伴异型淋巴细胞
42. 小儿腹泻重度脱水, 第一天静脉补液总量约为  
A. 60 ~ 90ml/kg  
B. 90 ~ 120ml/kg  
C. 120 ~ 150ml/kg  
D. 150 ~ 180ml/kg  
E. 180 ~ 210ml/kg
43. 儿童死亡率最高的时期是  
A. 新生儿期  
B. 胎儿期  
C. 婴儿期  
D. 幼儿期  
E. 围生期
44. 骨盆骨折易造成  
A. 肾损伤  
B. 尿道球部损伤  
C. 尿道膜部损伤  
D. 尿道前列腺部损伤  
E. 尿道球膜部交界处损伤
45. 抑郁症睡眠特征性是  
A. 浅多梦  
B. 入睡困难  
C. 睡眠过多  
D. 早醒  
E. 唤醒困难
46. 病因不明的急性腹膜炎行剖腹探查时, 手术切口一般多选择  
A. 左旁正中  
B. 右肋下缘  
C. 左肋下缘  
D. 正中  
E. 右旁正中
47. 肝癌的特异性标记物是  
A. 甲胎蛋白(AFP)  
B.  $\gamma$ -谷氨酰转肽酶同工酶 II (CGT - II)  
C. 异常凝血酶原(AP)  
D.  $\alpha$ -L-岩藻糖苷酶(AFU)  
E. 酸性同工铁蛋白(AIF)
48. 胰腺癌特异性肿瘤标记物是  
A. AFP  
B. CEA  
C. CA199  
D. CA125  
E. 碱性磷酸酶
49. 高血压合并肾功能不全, 降压药宜选  
A. ACEI  
B.  $\beta$ 受体阻滞剂  
C. 噻嗪类利尿剂  
D. 血管扩张剂  
E. 以上都不是
50. 股骨中下 1/3 骨折最经典的骨折类型是  
A. 骨折远端向内移位  
B. 骨折远端向后移位  
C. 骨折断端向前方成角  
D. 骨折远端向前移位  
E. 骨折近端向侧方移位
51. 支气管哮喘属于  
A. I 型超敏反应  
B. II 型超敏反应  
C. IV 型超敏反应  
D. III 型超敏反应  
E. 迟发型超敏反应
52. 正常小儿能坐时出现的生理弯曲是  
A. 颈椎前凸

- B. 骶椎后凸  
C. 胸椎后凸  
D. 腰椎前凸  
E. 胸椎前凸和颈椎前凸
53. Weber 综合征(大脑脚综合征)的临床表现为  
A. 对侧动眼神经麻痹,对侧偏瘫  
B. 同侧动眼神经麻痹,对侧偏瘫  
C. 同侧动眼神经麻痹,同侧偏瘫  
D. 对侧动眼神经麻痹,同侧偏瘫  
E. 以上都不对
54. 渗出液与漏出液的主要差异在于  
A. 液体量的多少不同  
B. 蛋白含量多少不同  
C. 发生的部位不同  
D. 发生的年龄不同  
E. 发生时间不同
55. 治疗类风湿性关节炎首选的改变病情的抗风湿药是  
A. 甲氨蝶呤  
B. 糖皮质激素  
C. 非甾体抗炎药  
D. 环磷酰胺  
E. 羟氯喹
56. 某患者自觉左侧肢体似有蚂蚁爬行,此种感觉障碍为  
A. 感觉过敏  
B. 感觉倒错  
C. 感觉过度  
D. 感觉异常  
E. 感觉减退
57. 体内糖、脂肪、蛋白质分解代谢的最终共同途径是  
A. 糖酵解  
B. 糖异生  
C. 三羧酸循环  
D. 糖原合成  
E. 糖原分解
58. 医务人员特别是护理人员最常见的安全事件是  
A. 化学伤害  
B. 锐器伤  
C. 生物伤害  
D. 电离辐射  
E. 中毒
59. 频数分布的两个重要特征是  
A. 统计量与参数  
B. 样本均数与总体均数  
C. 集中趋势与离散趋势  
D. 样本标准差与总体标准差  
E. 集中趋势与标准差
60. 下列哪项不是腹股沟斜疝的特点  
A. 多见于儿童及青壮年  
B. 经腹股沟管突出,可进阴囊  
C. 疝块呈椭圆或梨形,上部呈蒂柄形  
D. 疝囊颈在腹壁下动脉内侧  
E. 较多发生嵌顿
61. 对于直肠内高位带蒂息肉,最合理的切除方式是  
A. 经肛门用丝线从根部结扎切除  
B. 腹腔镜直肠部分切除  
C. 剖腹行局部切除术  
D. 经肛门用血管钳钳夹切除  
E. 内镜下高频电切除
62. 下列除哪种疾病外,蛋白尿均多见于  
A. 急性肾小球肾炎  
B. 慢性肾小球肾炎  
C. 原发性肾病综合征  
D. 慢性肾衰竭早期  
E. 急性肾盂肾炎
63. 患者将地上的草绳看成一条大蛇,这种表现是  
A. 感觉过敏  
B. 象征性思维  
C. 关系妄想  
D. 幻觉  
E. 错觉
64. 患者查阅医疗记录和复印部分病历的权利属于  
A. 知情同意权  
B. 隐私保护权  
C. 特殊干涉权  
D. 平等就医权  
E. 损害赔偿权
65. 以躯干、四肢等大腿肌肉群参与为主的,有节律、时间较长,能够维持在一个稳定状态的身体活动称为  
A. 阻力活动  
B. 体适能  
C. 协调性活动  
D. 无氧运动



- E. 有氧运动
66. 抗结核药物属于抑菌药的是
- 异烟肼
  - 利福平
  - 链霉素
  - 乙胺丁醇
  - 吡嗪酰胺
67. 肛诊检查触及黏膜外条索状肿物,质地稍硬、固定,最可能是
- 肛裂
  - 直肠癌
  - 肛瘘
  - 内痔
  - 直肠息肉
68. 内分泌疾病中属于功能亢进的是
- 尿崩症
  - 糖尿病
  - 库欣综合征
  - 呆小症
  - 黏液性水肿
69. 若用统计图直观地表示新冠病例不同职业的发病率随时间的变化情况,宜选择
- 圆形图
  - 直条图
  - 线图
  - 直方图
  - 散点图
70. 属于中枢神经系统抑制剂的是
- 酒精
  - 可卡因
  - 海洛因
  - 丙酮
  - 仙人掌毒素
71. 肠外营养的技术性并发症中最严重的是
- 神经损伤
  - 空气栓塞
  - 胸导管损伤
  - 气胸
  - 血胸
72. 下列关于气性坏疽的治疗不正确的是
- 一经诊断,应急诊清创
  - 伤口用3%过氧化氢或1:1 000高锰酸钾冲洗
  - 首选氨基糖苷类抗生素
  - 高压氧治疗
  - 营养支持治疗
73. 婴幼儿少尿的标准是每天尿量少于
- 50ml
  - 100ml
  - 150ml
  - 200ml
  - 250ml
74. 反复感染的支气管扩张患者,在抗感染治疗时应覆盖的病原体是
- 军团菌
  - 金黄色葡萄球菌
  - 肺炎球菌
  - 白色念珠菌
  - 铜绿假单胞菌
75. 肛周脓肿的穿刺液是
- 不凝的血性液体
  - 黄绿色透明液体,无臭味
  - 稀脓性液体,略带臭味
  - 淡黄色透明液体
  - 黄绿色稠厚液体,带有粪便样特殊臭味
76. 在我国,引起肝硬化的主要病因是
- 肝静脉阻塞综合征
  - 酒精性肝病
  - 药物性肝炎
  - 病毒性肝炎
  - 自身免疫性肝病
77. 继发性腹膜炎最常见致病菌应是
- 溶血性链球菌
  - 金黄色葡萄球菌
  - 肺炎双球菌和厌氧菌
  - 铜绿假单胞菌和肠球菌
  - 大肠埃希菌和厌氧菌
78. 以下检测方法中,不能确定目前存在幽门螺杆菌感染的是
- 胃黏膜组织染色
  - 快速尿素酶试验
  - 幽门螺杆菌培养
  - $^{13}\text{C}$ 或 $^{14}\text{C}$ 尿素呼吸试验
  - 血清幽门螺杆菌抗体测定
79. 医生对于患者的行为和表情细心观察,并给予回

- 应,属于
- A. 言语沟通
  - B. 非言语沟通
  - C. 言语沟通和非言语沟通
  - D. 目光沟通
  - E. 以上都不是
80. 左心衰竭特有的临床表现是
- A. 肝脏肿大
  - B. 下肢水肿
  - C. 颈静脉充盈
  - D. 夜间阵发性呼吸困难
  - E. 三尖瓣关闭不全的反流性杂音
81. 评价心脏功能最常用的检查方法是
- A. 常规心电图
  - B. 胸部 X 线
  - C. 心电图运动负荷试验
  - D. 超声心动图
  - E. 核素心肌显像
82. 决定肾结核的治疗方法,除全身情况外主要依据
- A. 膀胱刺激症状
  - B. 血尿程度
  - C. 尿中找到结核杆菌
  - D. 膀胱镜检查所见
  - E. 静脉尿路造影或逆行肾盂造影
83. 肾结石 1.9cm,首选治疗方案是
- A. 体外冲击波碎石
  - B. 经皮肾碎石
  - C. 经输尿管碎石
  - D. 腹腔镜下取石或开放性手术取石
  - E. 药物治疗及大量饮水
84. 由肾实质性因素导致的急性肾衰中,最常见的类型是
- A. 急性肾炎
  - B. 急进性肾炎
  - C. 急性肾小管坏死
  - D. 急性间质性肾炎
  - E. 多发性小血管炎
85. 正常小儿白细胞分类出现两次中性粒细胞与淋巴细胞比例相等的年龄是
- A. 1~3 天和 2~3 岁
  - B. 4~6 天和 4~6 岁
  - C. 7~9 天和 7~9 岁
  - D. 10~15 天和 8~9 岁
  - E. 15~20 天和 9~10 岁
86. 开放性气胸引起的病理生理紊乱表现为
- A. 患侧胸膜腔压力高于大气压,纵隔移向健侧
  - B. 患侧肺萎缩,呼吸功能减退
  - C. 吸气时,纵隔移向患侧
  - D. 呼气时,患侧胸膜腔压力低于大气压
  - E. 引起反常呼吸运动,导致呼吸、循环衰竭
87. 医学心理学对于健康和疾病的基本观点不包括
- A. 认知评价的观点
  - B. 个性特征作用的观点
  - C. 情绪因素作用的观点
  - D. 被动适应的观点
  - E. 心身统一的观点

A2 型选择题 (88—120 题)

答 题 说 明

每一道考题下面是一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

88. 男,80 岁。乏力、走路不稳 3 个月。查体:肌张力减低,共济失调,意向性震颤,指鼻试验阳性。该患者最可能的病变部位是
- A. 小脑
  - B. 皮层运动区
  - C. 脑干
  - D. 基底神经节
  - E. 脊髓
89. 男孩,3 岁。左侧阴囊包块,呈球形,光滑,无触痛,睾丸触摸不清,透光试验阳性。可能的诊断为
- A. 精索鞘膜积液
  - B. 交通性鞘膜积液
  - C. 睾丸肿瘤
  - D. 股沟斜疝
  - E. 睾丸鞘膜积液
90. 男,32 岁。腹泻 3 个月。大便每天 7~10 次,稀

- 便,无脓血黏液,伴乏力,体重减轻5kg。患者7年前曾到东南亚某国打工3年。查体:慢性病容,肛周周围有疱疹,疱疹内容物镜检查偶见白细胞。最可能的诊断是
- A. 艾滋病  
B. 慢性菌痢  
C. 溃疡性结肠炎  
D. 慢性肠炎  
E. 结肠癌
91. 男,50岁。多次于饮酒后关节红肿疼痛发作,累及的关节包括第一跖趾关节、踝或膝关节。查体:关节局部红肿,压痛明显。既往无类似发作。化验:血尿酸602mmol/L。目前最主要的治疗药物是
- A. 苯溴马隆  
B. 别嘌醇  
C. 抗生素  
D. 非甾体抗炎药  
E. 甲氨蝶呤
92. 男,1岁。因发热8天,皮疹3天入院。外院抗生素治疗7天无效。查体:T 39℃,烦躁不安,全身淡红色斑丘疹,双眼结膜充血,口唇鲜红、干裂、草莓舌,右颈淋巴结蚕豆大,质硬,有压痛。双肺呼吸音粗,心率130次/分,腹软,肝、脾无肿大,指、趾端硬性肿胀。实验室检查:WBC  $19 \times 10^9/L$ , N 0.78, L 0.22, Plt  $420 \times 10^9/L$ ,血沉120mm/h,血培养(-)。首选的治疗措施是
- A. 丙种球蛋白+糖皮质激素  
B. 对症治疗,观察  
C. 丙种球蛋白+阿司匹林  
D. 阿司匹林+糖皮质激素  
E. 青霉素
93. 男,60岁。嗜酒,急起高热,咳嗽,咳黏液脓性痰,量多,胸痛。胸片示右上肺叶实变,有多个蜂窝状空洞,叶间隙下坠。下列哪项诊断可能性最大
- A. 肺炎球菌肺炎  
B. 克雷伯杆菌肺炎  
C. 金黄色葡萄球菌肺炎  
D. 病毒性肺炎  
E. 肺炎支原体肺炎
94. 男,26岁。5天来鼻及牙龈出血,皮肤瘀斑。Hb 55g/L, WBC  $10.0 \times 10^9/L$ , Plt  $16 \times 10^9/L$ ,骨髓增生活跃,幼稚细胞占80%。胞浆有大小不等颗粒及成堆棒状小体,过氧化酶染色强阳性。本患者临床容易出现
- A. 巨脾  
B. DIC  
C. 严重感染  
D. 中枢神经系统受侵犯  
E. 齿龈肿胀
95. 女,8岁。因高度水肿及大量蛋白尿,予泼尼松60mg/d治疗10周,病情未缓解来诊。查体:T 36.5℃, P 80次/分, R 18次/分,颜面明显水肿,面色苍白,肺部未闻及啰音,心(-),腹部较膨隆,肝脾触及不清,四肢明显水肿。实验室检查蛋白尿(+++),尿沉渣镜检:RBC 50/HP,补体C<sub>3</sub>正常,肾功能正常。最可能的诊断是
- A. 先天性肾病综合征  
B. 肾炎性肾病综合征  
C. 单纯型肾病综合征  
D. 急性肾小球肾炎  
E. 慢性肾小球肾炎
96. 男,25岁。视物成双4月余。查体:双眼睑略下垂,瞳孔等大,对光反射存在,右眼不能向上和外展运动,左眼不能内收和下视运动,双鼻唇沟对称,双颊鼓气良好,余脑神经无异常。四肢肌张力正常,肌力5级,腱反射对称,病理征未引出,共济运动正常。眼轮匝肌低频重复电刺激示电位衰减25%。最可能的诊断
- A. 面神经炎  
B. 重症肌无力  
C. 周期性瘫痪  
D. Fisher综合征  
E. 吉兰-巴雷综合征
97. 女,55岁。8个月前骑电动车时摔倒,上腹部被车把撞伤并疼痛,经治疗后6个月前觉上腹部逐渐隆起,伴上腹饱胀,近日来常恶心、呕吐。查体:上腹部可触及直径约10cm包块,无肌紧张、压痛、反跳痛。影像学检查提示该患者上腹部10cm×10cm囊性肿物。最有可能的诊断是
- A. 腹部后血肿  
B. 脐疝  
C. 肝左叶囊肿  
D. 胰腺假性囊肿  
E. 十二指肠憩室
98. 女,17岁。近1个月来话多,情绪高涨,喜欢购物,

少眠,称自己是中央领导的女儿,自己能做大事,头脑聪明,好管闲事,爱打抱不平,做事虎头蛇尾。该患者诊断为

- A. 焦虑症
- B. 强迫症
- C. 精神分裂症
- D. 躁狂症
- E. 分离转换障碍

99. 男,56 岁。“流感”后出现高热,咳嗽,黄痰伴痰中带血。胸部 X 线示右下肺大片状影,其内可见多个圆形透亮区。最可能感染的病原体是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 厌氧菌
- C. 肺炎克雷伯杆菌
- D. 肺炎链球菌
- E. 肺炎支原体

100. 女,35 岁,因反复上腹疼痛,做胃镜检查诊断为十二指肠球溃疡,HP (+)。应选择下列哪组药物治疗最合适

- A. 奥美拉唑 + CBS + 抗生素
- B. 奥美拉唑 + 阿托品
- C. 硫糖铝 + 阿托品 + 抗生素
- D. 前列腺素 + 硫糖铝
- E. 法莫替丁 + 抗生素

101. 女,22 岁。右手及前臂被沸水烫伤 1 小时。查体:右手及前臂红肿明显,有水疱,部分水疱皮脱落,可见创面红白相间,疼痛迟钝。理论上判断该患者烧伤面积占体表面积的百分比是

- A. 5.5%
- B. 4.5%
- C. 3%
- D. 6.5%
- E. 9%

102. 女,孕 25 周。合并上呼吸道感染,需使用抗生素。下列抗菌药物中,孕期不能使用的是

- A. 青霉素类
- B. 氨基糖苷类
- C. 头孢菌素类
- D. 磷霉素钠
- E. 大环内酯类

103. 男,40 岁。自述 1 年来工作压力大,几乎每晚床上床后都要辗转许久才能入睡,稍有响动就醒,非常苦恼,给予每晚口服劳拉西泮 1mg,睡眠有所

改变。该患者合理使用苯二氮䓬类药物的原则是

- A. 小剂量和短疗程
- B. 小剂量临时使用
- C. 足剂量和长疗程
- D. 小剂量和长疗程
- E. 足剂量和短疗程

104. 初孕妇,25 岁。妊娠 37 周,剧烈头痛并呕吐 2 次,并自觉胎动减少 1 天,BP 160/110mmHg,尿蛋白(++),胎心率 130 次/分,宫颈管未消失,OCT 呈频繁晚期减速(迟发性减速),血细胞比容 0.41。最合适的处理是

- A. 静滴硫酸镁与肼苯哒嗪控制病情
- B. 硫酸镁加降压加扩容疗法控制病情
- C. 积极治疗,48 小时未能控制病情则行剖宫产
- D. 破膜加静滴缩宫素引产
- E. 积极药物治疗的同时立即剖宫产

105. 初产妇,因第二产程延长,行左侧会阴切开加低位产钳助产,娩出一 4 000g 活婴。产后 2 小时伤口疼痛。肛门坠胀并有便意,大便常规检验正常。体检:贫血貌,BP 190/60mmHg。左会阴稍肿,阴道出血不多。首先应作下列哪项处理

- A. 宫缩剂
- B. 阴道镜检查
- C. 肛指检查
- D. 抗炎
- E. 止血剂

106. 初产妇,25 岁。因第二产程延长,行产钳助产,产后阴道流血约 800ml,考虑为子宫收缩乏力所致。其主要临床表现应是

- A. 胎盘剥离延缓而出血
- B. 胎盘娩出后出血无血块
- C. 胎盘未娩出时出血不止
- D. 胎儿娩出后立即流血不止
- E. 胎盘娩出后阵发性出血时多时少

107. 女,35 岁。因接触性出血经巴氏涂片示巴氏Ⅲ级,活检诊断为浸润性宫颈癌,临床分期Ⅱ $\alpha$ 。治疗方案是

- A. 全子宫 + 双侧附件切除术
- B. 全子宫 + 双侧附件切除术 + 盆腔淋巴结清除术
- C. 次广泛性子宫 + 双侧附件切除术 + 盆腔淋巴结清除术

- D. 广泛性子宫 + 双侧附件切除术 + 盆腔淋巴结清除术  
E. 广泛性子宫 + 一侧附件切除术 + 盆腔淋巴结清除术
108. 男, 4 岁。诊断为血友病甲, 有牙龈出血。输血用  
A. 冷沉淀  
B. 白细胞  
C. 全血  
D. 浓缩红细胞  
E. 血小板
109. 男, 32 岁。因肝损伤急诊手术。曾患甲型肝炎已治愈。术中见肝右叶外侧 5cm 裂口, 深 3cm。术后肝肾功能检查正常, 食欲、体力恢复正常。肝脏损伤得以顺利修复, 从内环境分析, 主要起再生作用的是  
A. 不稳定细胞  
B. 肥大细胞  
C. 纤维细胞  
D. 稳定细胞  
E. 永久性细胞
110. 初孕妇, 26 岁。妊娠 38 周, 规律宫缩 8 小时, 宫口开大 6cm,  $S^{+1}$ , 胎膜已破, 胎儿体重估计 3 000g, BP 130/80mmHg, 胎心率 144 次/分。4 小时后肛查: 宫口仍 6cm, 边薄, 先露  $S^{+1}$ , 宫缩力弱, 20 秒/5~6 分钟, 胎心好。应诊断为  
A. 潜伏期延长  
B. 活跃期延长  
C. 活跃期停滞  
D. 第二产程延长  
E. 滞产
111. 男, 5 岁。持续高热 1 周。查体: T 39℃, P 128 次/分, R 36 次/分。热病容, 双眼结合膜充血, 口唇干裂, 可见草莓舌。皮肤呈弥漫性红斑, 颈部浅表淋巴结肿大。心音有力, 手足硬性水肿。最可能的诊断是  
A. 川崎病  
B. 手足口病  
C. 败血症  
D. 风湿热  
E. 猩红热
112. 幼儿, 10 月龄。高热 3 天, 后热退疹出。最可能的诊断是  
A. 麻疹  
B. 风疹  
C. 水痘  
D. 猩红热  
E. 幼儿急疹
113. 女, 26 岁。停经 50 天, 诊断为早期妊娠。在行人工流产负压吸宫术时, 突然出现面色苍白、出汗、头晕、胸闷。查体: T 36.5℃, Bp80/50mmHg, 心率 55 次/分。最可能的诊断是  
A. 漏吸  
B. 人工流产综合  
C. 子宫穿孔  
D. 羊水栓塞  
E. 仰卧位低血压综合征
114. 男, 26 岁。发现高血压 2 年。查体: 双上肢血压 180/100mmHg, 双下肢血压 140/80mmHg, BMI 20, 腰围 80cm。正力体型。心尖区可闻及 2/6 级收缩期杂音, 肩胛间区可闻及血管杂音, 余瓣膜区未闻及杂音。该患者最可能的诊断是  
A. 嗜铬细胞瘤  
B. 皮质醇增多症  
C. 原发性醛固酮增多症  
D. 主动脉缩窄  
E. 肾动脉狭窄
115. 女, 48 岁。外阴瘙痒伴灼热感 3 天。妇科检查: 见外阴红肿、小阴唇内侧及阴道黏膜表面有白色凝乳状物覆盖。该患者首先考虑为  
A. 前庭大腺炎  
B. 淋菌性阴道炎  
C. 外阴阴道念珠菌病  
D. 滴虫性阴道炎  
E. 细菌性阴道炎
116. 男, 60 岁。恶心、呕吐 1 周。查体: BP 160/100mmHg, 肋骨压痛。尿常规: 蛋白尿 (+)。尿沉渣镜检: RBC (-)。尿蛋白定量 3.2g/d。血 Scr 350  $\mu\text{mol/L}$ , 血钾 3.3mmol/L。B 超示双肾增大。其最可能出现的血清学异常是  
A. 蛋白电泳示多种免疫球蛋白升高  
B. 抗肾小球基底膜抗体阳性  
C. 抗核抗体阳性  
D. 免疫固定电泳示单克隆免疫球蛋白  
E. 抗中性粒细胞浆抗体阳性
117. 女, 30 岁。因头疼 3 个月, 加重伴呕吐、间断抽搐、视物模糊 1 个月就诊。近 2 年来, 喜食生肉。

眼底检查发现视神经盘水肿。最可能的诊断是

- A. 脑囊尾蚴病
- B. 结核性脑膜炎
- C. 隐球菌性脑膜炎
- D. 脑肿瘤
- E. 病毒性脑炎

118. 女, 24 岁。头晕、乏力伴月经量增多 1 年。既往体健。查体: 下肢皮肤瘀点, 肝脾肋下未触及。血常规: Hb 60g/L, WBC  $2.8 \times 10^9/L$ , Plt  $38 \times 10^9/L$ , 网织红细胞 0.001。胸骨骨髓细胞学检查骨髓增生活跃, 未见巨核细胞。最可能的诊断是

- A. 特发性血小板减少性紫癜
- B. 再生障碍性贫血
- C. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- D. 慢性失血性贫血
- E. 骨髓增生异常综合征

119. 女, 46 岁。两眼不能完全睁开, 全身无力, 前纵隔内发现肿块。最可能的是

- A. 胸腺瘤
- B. 淋巴瘤
- C. 心包囊肿
- D. 支气管囊肿
- E. 神经源性肿瘤

120. 初孕妇, 30 岁。妊娠 35 周, 血压升高 3 周, 今晨突然腹痛, 呈持续性, 阵发性加重。查体: BP 150/98mmHg, 心率 112 次/分, 尿蛋白(++) , 阴道少量流血。此时对诊断最有价值的辅助检查是

- A. 眼底检查
- B. B 型超声检查
- C. 肝功能检查
- D. 白细胞计数
- E. 血细胞比容

A3/A4 型选择题 (121—138 题)

答 题 说 明

以下提供若干个案例, 每个案例下设若干道试题。请根据案例提供的信息, 在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(121—122 题共用题干)

男, 64 岁。胸骨后烧灼样疼痛 2 周, 伴暖气, 偶有吞咽不畅。口服奥美拉唑治疗 2 周后疼痛缓解。

121. 应首先考虑的诊断是

- A. 消化性溃疡
- B. 食管癌
- C. 心绞痛
- D. 贲门失迟缓综合征
- E. 胃食管返流病

122. 目前首选的检查是

- A. 心电图
- B. 冠状动脉造影
- C. 胃镜
- D. 24 小时食管 pH 监测
- E. 超声心动图

(123—124 题共用题干)

女, 55 岁。反复咳嗽、咳痰、气促 30 年, 加重伴低热 1 周。既往高血压病史 10 年, 血压控制满意。查体: T 38°C, P 110 次/分, R 24 次/分, BP 160/90mmHg。口唇

发绀, 颈静脉怒张, 双肺可闻及哮鸣音和湿啰音, 心率 110 次/分, 律齐,  $P_2 > A_2$ , 剑突下可闻及 3/6 级收缩期杂音。腹膨隆, 肝肋下 4cm, 压痛(+), 肝颈静脉回流征阳性, 双下肢水肿。

123. 该患者最可能的诊断是

- A. 冠状动脉粥样硬化性心脏病
- B. 心肌病
- C. 肺血栓栓塞
- D. 慢性肺源性心脏病
- E. 风湿性心脏瓣膜病

124. 对明确诊断最有价值的检查是

- A. 胸部 X 线
- B. 超声心动图
- C. 血气分析
- D. 心电图
- E. 血 D-二聚体

(125—126 题共用题干)

男, 70 岁。进行性排尿困难 5 年, 夜尿 4~5 次。近期曾发生急性尿潴留 2 次, 既往体健。心肺功能正

常。前列腺Ⅱ°肿大,血清PSA 1.8 $\mu\text{g/L}$ ,膀胱残余尿80ml。

125. 最可能的诊断是

- A. 前列腺癌
- B. 膀胱经挛缩
- C. 前列腺增生
- D. 神经源性膀胱功能障碍
- E. 泌尿系结石

126. 首选的手术方法是

- A. 双侧睾丸切除
- B. 经会阴前列腺切除
- C. 经尿道前列腺切除
- D. 耻骨上前列腺切除
- E. 耻骨后前列腺切除

(127—128 题共用题干)

女,18岁。甲状腺弥漫性肿大,无突眼,甲状腺摄碘试验:2小时25%,24小时50%。清晨空腹测定P 70次/分,BP 120/80mmHg,SPECT检查甲状腺无结节。

127. 最可能的诊断是

- A. 甲状腺功能减退
- B. 甲状腺功能亢进
- C. 甲状腺炎
- D. 单纯性甲状腺肿
- E. 结节性甲状腺肿

128. 该患者最适宜的治疗是

- A. 复方碘溶液
- B. 小剂量甲状腺素治疗
- C. 甲巯咪唑
- D. 手术治疗
- E. 核素 $^{131}\text{I}$ 治疗

(129—130 题共用题干)

男,40岁。于3天前发生车祸被撞伤左上腹,现左上腹持续性疼痛3小时。查体:P 140次/分,BP 60/45mmHg,面色苍白,四肢厥冷,双肺呼吸音清,心率140次/分,上腹中度压痛,肌紧张,移动性浊音(+).腹腔穿刺抽出不凝血。

129. 最可能的诊断是

- A. 肝破裂
- B. 脾破裂
- C. 结肠破裂
- D. 小肠破裂
- E. 胃破裂

130. 该患者最主要的治疗措施是

- A. 小肠部分切除术
- B. 抗休克同时行肝切除术
- C. 肝脏缝合修补术
- D. 抗休克同时行脾切除术
- E. 结肠修补术

(131—132 题共用题干)

男,13岁。右股骨下端疼痛2个月,夜间加重。

查体:右股骨下端局部肿胀、皮温增高。X线示右股骨上端日光射线样改变。

131. 首先考虑的诊断是

- A. 慢性骨髓炎
- B. 骨巨细胞瘤
- C. 骨样骨瘤
- D. 股骨结节骨软骨病
- E. 骨肉瘤

132. 确诊该病的检查方法是

- A. CT
- B. MRI
- C. B超
- D. 核素扫描
- E. 组织活检

(133—134 题共用题干)

女,18岁。间断排黏液脓血便伴发热2个月。每天大便10余次。体温波动在38.0~39.5 $^{\circ}\text{C}$ ,广谱抗生素治疗1周后症状无好转。结肠镜检查全结肠弥漫性充血、糜烂,伴溃疡形成。

133. 最可能的诊断是

- A. 肠易激综合征
- B. 重型溃疡性结肠炎
- C. 肠结核
- D. 克罗恩病
- E. 慢性细菌性痢疾

134. 首选的治疗药物是

- A. 美沙拉嗪
- B. 硫唑嘌呤
- C. 泼尼松
- D. 异烟肼
- E. 蒙脱石散

(135—136 题共用题干)

女,8岁。剧烈运动后胸闷,气短2个月。查体:心前区未触及震颤,胸骨左缘2、3肋间闻及3/6级收缩期杂音,P<sub>2</sub>亢进,固定分裂。

135. 最可能的诊断是

- A. 动脉导管未闭
- B. 单纯肺动脉瓣狭窄

- C. 房间隔缺损
- D. 中型室间隔缺损
- E. 小型室间隔缺损

136. 最典型的心电图改变是

- A. 左室高电压
- B. 不完全性右束传导阻滞和电轴右偏
- C. 左心房肥大
- D. 二度房室传导阻滞 I 型
- E. 一度房室传导阻滞

(137—138 题共用题干)

女, 16 岁。大学二年级学生。1 年前和同学争吵

后, 便觉的同学都在议论她, 常不怀好意地盯着她, 甚至觉得有人跟踪她, 想杀她。整天不敢出门, 在屋里自言自语。

137. 该患者的诊断最恰当的是

- A. 癔症
- B. 强迫症
- C. 精神分裂症
- D. 躁狂症
- E. 急性惊恐发作

138. 该患者治疗有效的是

- A. 碳酸锂
- B. 氟哌啶醇
- C. 丙米嗪
- D. 地西洋
- E. 异丙嗪

**B1 型选择题 (139—150 题)**

**答 题 说 明**

以下提供若干组试题, 每组试题共用在试题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(139—140 题共用备选答案)

- A. ACEI
- B. 利尿剂
- C.  $\beta$  受体阻滞剂
- D. 钙离子拮抗剂
- E.  $\alpha$  受体阻滞剂

139. 高血压合并糖尿病, 血肌酐正常, 选用下列哪类降压药最合适

140. 高血压合并甲亢, 选用下列哪类降压药最合适

(141—142 题共用备选答案)

- A. 双趋冲突
- B. 双避冲突
- C. 趋避冲突
- D. 双重趋避冲突
- E. 双趋双避冲突

140. “前有狼, 后有虎” 的动机冲突属于

141. “鱼与熊掌不能兼得” 的动机冲突属于

(143—144 题共用备选答案)

- A. 淋病
- B. 一期梅毒
- C. 二期梅毒
- D. 三期梅毒
- E. 尖锐湿疣

143. 表现为硬下疳的疾病是

144. 主要表现为皮肤梅毒疹的疾病是

(145—146 题共用备选答案)

- A. 47, XY(XX), +21
- B. 46, XY(XX), -21, +t(21q21q)
- C. 46, XY(XX), 47, XY(XX), +21
- D. 46, XY(XX), -14, +t(14q21q)
- E. 45, XY(XX), -14, -21, +t(14q21q)

145. 标准型 21 - 三体综合征的核型为

146. 嵌合体型 21 - 三体综合征的核型为

(147—148 题共用备选答案)

- A. 卵黄囊瘤
- B. 卵巢黏液性囊腺瘤
- C. 卵巢黄素化囊肿
- D. 卵巢颗粒细胞瘤
- E. 成熟畸胎瘤

147. 属于卵巢性索间质肿瘤的是

148. 最常见的女性生殖细胞肿瘤的是

(149—150 题共用备选答案)

- A. 粪便培养
- B. 血培养
- C. 尿培养
- D. 骨髓培养
- E. 胆汁培养

149. 确诊伤寒最常用的检测方法是

150. 确诊霍乱最常用的检测方法是